




สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายประเทศไทย ประจำปีสัปดาห์ที่ 45/2561
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา (Chikungunya fever) จากการรายงานในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 พบผู้ป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 190 ราย อัตราป่วย 0.29 ต่อประชากรแสนคน แต่ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 ผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องและลดลงต่ำสุดในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 10 ราย อัตราป่วย 0.01 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยสะสม 890 ราย อัตราป่วย 1.35 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาถึง 37 เท่า เป็นผู้ป่วยเพศหญิง 552 ราย เพศชาย 338 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 1.63 พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและสูงสุดในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วย 2.45 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออายุ 30 - 34 ปี (2.01) อายุ 25 - 29 ปี (1.96) อายุ 20 - 24 ปี (1.86) และ 35 - 39 ปี (1.66) ตามลำดับ ประกอบอาชีพรับจ้างหรือกรรมกรมากที่สุด ร้อยละ 35.73 รองลงมาคือนักเรียน (26.63) และงานบ้าน (12.92) แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์เป็นดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 ผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายรายสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2560, 2561 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 - 20 พฤศจิกายน 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายรายใหม่ จำนวน 248 ราย จาก 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส

ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ อัตราป่วย 9.43 ต่อประชากรแสนคน ได้แก่ จังหวัดสตูล นราธิวาส สงขลา ภูเก็ต และตรัง อัตราป่วย 68.83, 28.29, 25.85, 5.67 และ 3.74 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ (ดังตารางที่ 2) และพบมากในช่วงฤดูฝนตามจำนวนประชากรที่มีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พฤษภาคมและสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 28.20 รองลงมาคือเดือนตุลาคม (24.27) สิงหาคม (14.61) และกันยายน (11.24) ตามลำดับ

ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2561 มีเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด 3 เหตุการณ์ จาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ระยอง และตราด (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เหตุการณ์โรคไข้วัดข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สำนักระบาดวิทยา
รายจังหวัด อำเภอบ้านปลิว ปี พ.ศ. 2561

เหตุการณ์	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	วันที่พบผู้ป่วย รายแรก	วันที่พบผู้ป่วย รายสุดท้าย	ผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ
สงสัยโรคไข้วัดข้อมูล	สงขลา	หาดใหญ่	ควนลัง	2	13 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61	รอผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ
สงสัยโรคไข้วัดข้อมูล	ระยอง	บ้านฉาง	บ้านฉาง	1	16 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	รอผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ
สงสัยโรคไข้วัดข้อมูล	ตราด	เขาสมิง	แสนตุง	1	17 พ.ย. 61	21 พ.ย. 61	รอผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 2 จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้วัดข้อมูล รายจังหวัด และอำเภอที่พบผู้ป่วย พ.ศ. 2561

จังหวัด	อำเภอ	จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
สตูล	เมืองสตูล ควนโดน ท่าแพ ละงู พงษ์เทพ	221	68.83
นราธิวาส	เมืองนราธิวาส ตากใบ ยี่งอ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร แว้ง สุโงะโลก สุโงะปาตี เจาะไอร้อง	224	28.29
สงขลา	เมืองสงขลา สทิงพระ จันทบุรี เทพา สะบ้าย้อย กระแส- สินธุ์ รัตภูมิ สะเดา หาดใหญ่ ควนเนียง บางกล่ำ สิงหนคร คลองหอยโข่ง	370	25.85
ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต ถลาง	22	5.67
ตรัง	เมืองตรัง กันตัง ห้วยยอด วังวิเศษ	24	3.74
ยะลา	เมืองยะลา ธารโต	8	1.53
กระบี่	เมืองกระบี่	5	1.07
ปัตตานี	เมืองปัตตานี โคกโพธิ์ หนองจิก ยะหริ่ง	6	0.85
พัทลุง	เมืองพัทลุง ควนขนุน ปากพะยูน	3	0.57
สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี	2	0.19
กรุงเทพมหานคร	เขตคลองเตย เขตยานนาวา เขตจอมทอง เขตบางกะปิ	5	0.09

อ้างอิง : ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้วัดข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา

การประเมินความเสี่ยง

สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายสัปดาห์นี้ ยังคงระบาดในพื้นที่ภาคใต้ และพบประปรายบางจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผู้ป่วยถึง 890 ราย และเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วถึง 248 ราย และมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรมีมาตรการและการเฝ้าระวังโรคโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานที่มีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพรับจ้างหรือเกษตรกรรมที่พบมีการรายงานสูงกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายคือยุงพาหะนำโรค ดังนั้นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงยังคงเป็นมาตรการที่ต้องเน้นย้ำและให้ความสำคัญและเพื่อควบคุมการระบาดของโรคนอกจากการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้ว การสื่อสารให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด เช่น การสวมเสื้อแขนยาวขาวยาว ทายากันยุง เป็นต้น