






ประจำเดือนกันยายน 2567

การเฝ้าระวังนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ ร่วมกับ 3 โรงพยาบาลเครือข่าย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก DFAT ผ่านองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจรุนแรงในนักท่องเที่ยวหรือประชาชนในจังหวัดดังกล่าว เริ่มดำเนินการ 1 มีนาคม 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีตัวอย่างส่งตรวจ **จำนวน 662 ราย/ ตัวอย่าง** เป็นตัวอย่างจากโรงพยาบาลปาดอง ร้อยละ 50.76 , โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร้อยละ 42.30 และโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 6.95 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 471 ตัวอย่าง ร้อยละ 71.15

ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่ส่งตัวอย่าง (N = 662)



กรณีเป็นชาวต่างชาติ พบเดินทางมาจากประเทศต้นทาง ดังนี้ ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส (4 ราย) อังกฤษ (3 ราย) ซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอเมริกา (2 ราย) เดนมาร์ก, เยอรมนี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, มาเลเซีย, เมียนมา, สวีเดน, ตุรกี (1 ราย) และไม่ระบุประเทศต้นทาง (49 ราย)


จำนวนตัวอย่างส่งตรวจและร้อยละการตรวจพบเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจ จำแนกตามโรงพยาบาล วันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567

โรงพยาบาล	จำนวนที่ส่งตรวจ (ราย)	จำนวนที่ตรวจพบเชื้อ (ราย)	% Pos	เชื้อที่ตรวจพบสูงสุด 3 อันดับแรก ราย (ร้อยละ)
รวม	662	471	71.15	
ปาดอง	336	245	72.92	1.HRV 79 (22.38) 2.HI 70 (19.83) 3.SP 46 (13.03)
วชิระภูเก็ต	280	195	69.64	1.HI 48 (17.39) 2.HRV 43 (15.58) 3.SP 42 (15.22)
นครพิงค์	46	31	67.39	1.HI 10 (20.00) 2.HRV 8 (16.00) 3.SP 6 (12.00)

HRV หมายถึง Human Rhinovirus, HI หมายถึง Haemophilus influenzae
SP หมายถึง Streptococcus pneumoniae, % Pos หมายถึง ร้อยละตัวอย่างที่ให้ผลบวก (Percent positive)

จำนวนและร้อยละการตรวจพบเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจทางห้องปฏิบัติการ รายเดือน

วันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567



ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน สัดส่วนการตรวจพบเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจรุนแรง เดือนกรกฎาคม - กันยายน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน จากการตรวจพบเชื้อ Human rhinovirus มากที่สุด จึงขอแนะนำ ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ในเด็กเล็กหมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่คนแออัด และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่ป่วยเป็นโรคหวัด ลดการสัมผัสกับผู้ป่วย หรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อป่วย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น