



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568




กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2558 - 2567) ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค กองระบาดวิทยา พบว่าอัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง โดยพบอัตราป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 และต่ำสุดในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีหลังมีแนวโน้มคงที่ ในส่วนของอัตราป่วยตายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 - 4 รายต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี จะมีการรายงานสูงขึ้นในช่วงต้นปีและลดลงในช่วงกลางปีและปลายปีตามลำดับ โดยจะพบการรายงานสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์

ปี พ.ศ.2568 (1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2568) ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา มีรายงานผู้ป่วยสะสม 108,343 ราย อัตราป่วย 166.91 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย พบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ (รูปที่ 1) กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี 575.37 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (342.88) และกลุ่มอายุ 20 - 29 ปี (213.87) ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคกลาง 232.88 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ (157.56) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (135.28) และภาคใต้ (96.56) จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร (462.16) อุบลราชธานี (394.68) ชลบุรี (357.05) ภูเก็ต (309.92) และสุรินทร์ (294.90)

รูปที่ 1 : จำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ.2567, 2568
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2563 - 2567)




ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา



ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โดยกองระบาดวิทยาดำเนินการเฝ้าระวังร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย และศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีตัวอย่างส่งตรวจสะสม 3,877 ราย ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 1,745 ราย (ร้อยละ 45.01) เชื้อที่พบมากที่สุด Rotavirus ร้อยละ 39.14 (683 ราย) Norovirus GII ร้อยละ 30.26 (528 ราย) Sapovirus ร้อยละ 6.02 (105 ราย) Adenovirus ร้อยละ 4.58 (80 ราย) Astrovirus ร้อยละ 3.72 (65 ราย) และ Norovirus GI ร้อยละ 2.41 (42 ราย) นอกจากนี้พบผู้ที่ตรวจเจอเชื้อไวรัสก่อโรคมากกว่า 1 ชนิด ร้อยละ 13.87 (242 ราย)

รูปที่ 2 : จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจจำแนกตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรายเดือน และร้อยละของการตรวจพบเชื้อ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561- 28 กุมภาพันธ์ 2568



02 590 3900



doe_cd@ddc.mail.go.th



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ.2568 (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568) มีตัวอย่างส่งตรวจสะสม 93 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 10 แห่ง เพศชาย 49 ราย และ เพศหญิง 44 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1 : 1.11 ตัวอย่างที่ส่งตรวจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (ร้อยละ 49.46) ค่ามัธยฐานอายุของผู้ป่วยที่ส่งตรวจเท่ากับ 5 ปี (อายุระหว่าง 16 วัน – 87 ปี) ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 46 ราย (ร้อยละ 49.46) เชื้อที่พบมากที่สุด คือ Norovirus GII ร้อยละ 41.30 รองลงมา คือ Astrovirus ร้อยละ 23.91 Rotavirus ร้อยละ 17.39 Sapovirus ร้อยละ 13.04 และ Adenovirus ร้อยละ 2.17 นอกจากนี้พบผู้ที่ตรวจเจอเชื้อไวรัสก่อโรคมมากกว่า 1 ชนิด จำนวน 1 ราย เมื่อพิจารณาการตรวจพบเชื้อจำแนกตามกลุ่มอายุเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี (7/12, 58.33%) กลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี (26/46, 56.52%) กลุ่มอายุ 25 – 59 ปี (7/14, 50.00%) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (3/8, 37.50%) และกลุ่มอายุ 10– 14 ปี (3/11, 27.27%) โดยกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ยังตรวจไม่พบเชื้อ

ผลการตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกตามเชื้อที่พบ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ	จำนวนที่ส่งตรวจ (ราย)	จำนวนที่ตรวจพบเชื้อ (ราย)	% Positive	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ)						
				Norovirus GI	Norovirus GII	Rotavirus	Adenovirus	Astrovirus	Sapovirus	พบไวรัสมากกว่า 1 ชนิด
รวม	93	46	49.46	0 (0.00)	19 (41.30)	8 (17.39)	1 (2.17)	11 (23.91)	6 (13.04)	1 (2.17)
วชิระภูเก็ต	28	13	46.43	0	7	2	0	3	1	0
ตรัง	20	9	45.00	0	0	3	1	2	2	1
แม่จัน	15	7	46.67	0	5	0	0	1	1	0
พระนครศรีอยุธยา	8	2	25.00	0	1	0	0	1	0	0
พระปกเกล้า	8	5	62.50	0	0	2	0	1	2	0
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	6	5	83.33	0	1	1	0	3	0	0
นครพนม	5	4	80.00	0	4	0	0	0	0	0
ประจวบคีรีขันธ์	1	1	100	0	1	0	0	0	0	0
สันป่าตอง	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
เสนา	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0




ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน “ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2568”

- มีตัวอย่างส่งตรวจจำนวน 20 ตัวอย่าง
- จากโรงพยาบาลเครือข่าย 5 แห่ง ได้แก่
 - โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง จำนวน 12 ราย
 - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต จำนวน 5 ราย
 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี จำนวน 1 ราย
 - โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ราย
 - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ราย
- เพศหญิง 10 ราย และเพศชาย 10 ราย
- ค่ามัธยฐานอายุของผู้ป่วยที่ส่งตรวจเท่ากับ 2 ปี (อายุ 3 เดือน – 22 ปี)
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ 45.00)
- เชื้อที่พบมากที่สุด คือ **Astrovirus (ร้อยละ 33.33)** และ **Sapovirus (ร้อยละ 33.33)**

ร้อยละของตัวอย่างที่ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกตามเชื้อที่พบ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ (N = 9)

เชื้อที่พบ	จำนวน (ร้อยละ)
1. Astrovirus	3 (33.33)
2. Sapovirus	3 (33.33)
3. Rotavirus	2 (22.22)
4. Adenovirus	1 (11.11)



ผู้เรียบเรียง : กาญจนา เมณฑ์กุล, ภาวิณี ดั่งเงิน, ชญานิจ มหาสิงห์

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



02 590 3900



doe_cd@ddc.mail.go.th