



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ประจำเดือนมีนาคม 2568




กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2558 – 2567) ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค กองระบาดวิทยา พบว่าอัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง โดยพบอัตราป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 และต่ำสุดในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีหลังมีแนวโน้มคงที่ ในส่วนของอัตราป่วยตายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 – 4 รายต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี จะมีการรายงานสูงขึ้นในช่วงต้นปีและลดลงในช่วงกลางปีและปลายปีตามลำดับ โดยจะพบการรายงานสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์

ปี พ.ศ.2568 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2568) ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา มีรายงานผู้ป่วยสะสม 175,429 ราย อัตราป่วย 270.26 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย พบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ (รูปที่ 1) กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี 907.87 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี (498.47) และกลุ่มอายุ 20 – 29 ปี (353.20) ภาคว่าที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคกลาง 362.91 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ (268.09) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (215.62) และภาคใต้ (180.85) จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร (631.94) ชลบุรี (597.93) อุบลราชธานี (581.13) ภูเก็ต (524.76) และสมุทรสาคร (462.21)

**รูปที่ 1 : จำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ.2567, 2568
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2563 – 2567)**




ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา



ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โดยกองระบาดวิทยาดำเนินการเฝ้าระวังร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย และศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2568 มีตัวอย่างส่งตรวจสะสม 3,898 ราย ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 1,758 ราย (ร้อยละ 45.10) เชื้อที่พบมากที่สุด Rotavirus ร้อยละ 38.96 (685 ราย) Norovirus GII ร้อยละ 30.15 (530 ราย) Sapovirus ร้อยละ 6.03 (106 ราย) Adenovirus ร้อยละ 4.55 (80 ราย) Astrovirus ร้อยละ 3.87 (68 ราย) และ Norovirus GI ร้อยละ 2.39 (42 ราย) นอกจากนี้พบผู้ที่ตรวจเจอเชื้อไวรัสก่อโรคมมากกว่า 1 ชนิด ร้อยละ 14.05 (247 ราย)

**รูปที่ 2 : จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจจำแนกตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรายเดือน
และร้อยละของการตรวจพบเชื้อ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561– 31 มีนาคม 2568**



02 590 3900



doe_cd@ddc.mail.go.th



รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ประจำเดือนมีนาคม 2568



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ.2568 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2568) มีตัวอย่างส่งตรวจสะสม 114 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง เพศชาย 59 ราย และเพศหญิง 55 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1 : 1.07 ตัวอย่างที่ส่งตรวจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (ร้อยละ 49.12) ค่ามัธยฐานอายุของผู้ป่วยที่ส่งตรวจเท่ากับ 5 ปี (อายุระหว่าง 16 วัน – 87 ปี) ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 59 ราย (ร้อยละ 51.75) เชื้อที่พบมากที่สุด คือ Norovirus GII ร้อยละ 35.59 รองลงมา คือ Astrovirus ร้อยละ 23.73 Rotavirus ร้อยละ 16.95 Sapovirus ร้อยละ 11.86 และ Adenovirus ร้อยละ 1.69 นอกจากนี้พบผู้ที่ตรวจเจอเชื้อไวรัสก่อโรคมามากกว่า 1 ชนิด จำนวน 6 ราย เมื่อพิจารณาการตรวจพบเชื้อจำแนกตามกลุ่มอายุเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี (12/18, 66.67%) กลุ่มอายุ 25 – 59 ปี (9/16, 56.25%) กลุ่มอายุ 0-4 ปี (30/56, 53.57%) กลุ่มอายุ 10-14 ปี (5/13, 38.46%) และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (3/9, 33.33%) โดยกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ยังตรวจไม่พบเชื้อ

ผลการตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกตามเชื้อที่พบ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2568

โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ	จำนวนที่ส่งตรวจ (ราย)	จำนวนที่ตรวจพบเชื้อ (ราย)	% Positive	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ)						
				Norovirus GI	Norovirus GII	Rotavirus	Adenovirus	Astrovirus	Sapovirus	พบไวรัสมากกว่า 1 ชนิด
รวม	114	59	51.75	0	21 (35.59)	10 (16.95)	1 (1.69)	14 (23.73)	7 (11.86)	6 (10.17)
วชิระภูเก็ต	28	13	46.43	0	7	2	0	3	1	0
ตรัง	33	16	48.48	0	0	5	1	3	3	4
แม่จัน	21	12	57.14	0	6	0	0	3	1	2
พระนครศรีอยุธยา	9	3	33.33	0	2	0	0	1	0	0
พระปกเกล้า	8	5	62.50	0	0	2	0	1	2	0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	6	5	83.33	0	1	1	0	3	0	0
นครพนม	5	4	80.00	0	4	0	0	0	0	0
ประจวบคีรีขันธ์	1	1	100	0	1	0	0	0	0	0
สันป่าตอง	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
เสนา	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
พระนารายณ์มหาราช	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0




ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน “ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2568”

- มีตัวอย่างส่งตรวจจำนวน 21 ตัวอย่าง
- จากโรงพยาบาลเครือข่าย 4 แห่ง ได้แก่
 - โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง จำนวน 13 ราย
 - โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย จำนวน 6 ราย
 - โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ราย
 - โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี จำนวน 1 ราย
- เพศหญิง 11 ราย และเพศชาย 10 ราย
- ค่ามัธยฐานอายุของผู้ป่วยที่ส่งตรวจเท่ากับ 5 ปี (อายุ 7 เดือน – 60 ปี)
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจำนวน 13 ตัวอย่าง (ร้อยละ 61.90)
- เชื้อที่พบมากที่สุด คือ **Norovirus GII** จำนวน 5 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นการติดเชื้อร่วมกับไวรัสอื่น จำนวน 3 ราย

ร้อยละของตัวอย่างที่ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกตามเชื้อที่พบ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม (N = 13)

เชื้อที่พบ	จำนวน (ร้อยละ)
1. Astrovirus	3 (23.08)
2. Norovirus GII	2 (15.38)
3. Rotavirus	2 (15.38)
4. Sapovirus	1 (7.69)
5. Norovirus GII + Sapovirus	2 (15.38)
6. Norovirus GI + Norovirus GII	1 (7.69)
7. Rotavirus + Astrovirus	1 (7.69)
8. Rotavirus + Sapovirus	1 (7.69)



ผู้เรียบเรียง : กาญจนา เมณฑ์กุล, ภาวิณี ดั่งเงิน, ชญานิจ มหาสิงห์

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



02 590 3900



doe_cd@ddc.mail.go.th