



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568




กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2558 – 2567) ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค กองระบาดวิทยา พบว่าอัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง โดยพบอัตราป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 และต่ำสุดในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีหลังมีแนวโน้มคงที่

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี จะมีการรายงานสูงขึ้นในช่วงต้นปีและลดลงในช่วงกลางปีและปลายปีตามลำดับ โดยจะพบการรายงานสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์

ปี พ.ศ.2568 (1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2568) ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา มีรายงานผู้ป่วยสะสม 774,612 ราย อัตราป่วย 1,193.32 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 13 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.002 พบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ (รูปที่ 1) กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี 3,816.70 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 20 – 29 ปี (1,617.30) และกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี (1,593.50) ภาคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ภาคกลาง 1,519.14 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ (1,225.89) ภาคใต้ (1,133.83) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (867.82) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ภูเก็ต (4,334.67) ชลบุรี (3,124.58) สมุทรสาคร (2,672.71) กรุงเทพมหานคร (2,038.46) และอุบลราชธานี (1,851.44)

รูปที่ 1 : จำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ.2567, 2568
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2563 – 2567)




ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance; DDS) กองระบาดวิทยา



ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โดยกองระบาดวิทยาดำเนินการเฝ้าระวังร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย และศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2568 มีตัวอย่างส่งตรวจสะสม 4,268 ราย ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 1,889 ราย (ร้อยละ 44.26) เชื้อที่พบมากที่สุด Rotavirus ร้อยละ 38.91 (735 ราย) Norovirus GII ร้อยละ 30.12 (569 ราย) Sapovirus ร้อยละ 5.77 (109 ราย) Adenovirus ร้อยละ 4.76 (90 ราย) Astrovirus ร้อยละ 3.71 (70 ราย) และ Norovirus GI ร้อยละ 2.54 (48 ราย) นอกจากนี้พบผู้ที่ตรวจเจอเชื้อไวรัสก่อโรคมากกว่า 1 ชนิด ร้อยละ 14.19 (268 ราย)

รูปที่ 2 : จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจจำแนกตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรายเดือน และร้อยละของการตรวจพบเชื้อ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561– 30 พฤศจิกายน 2568



02 590 3900



doe_cd@ddc.mail.go.th



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ.2568 (1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2568) มีตัวอย่างส่งตรวจสะสม 484 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง เพศหญิง 219 ราย และเพศชาย 265 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1 : 1.21 ตัวอย่างที่ส่งตรวจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (ร้อยละ 60.54) ค่ามัธยฐานอายุของผู้ป่วยที่ส่งตรวจเท่ากับ 2 ปี (อายุระหว่าง 16 วัน – 88 ปี) ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 190 ราย (ร้อยละ 39.26) เชื้อที่พบมากที่สุด คือ Norovirus GII ร้อยละ 31.58 และ Rotavirus ร้อยละ 31.58 รองลงมา คือ Astrovirus ร้อยละ 8.42 Adenovirus ร้อยละ 5.79 Sapovirus ร้อยละ 5.26 และ Norovirus GI ร้อยละ 3.16 นอกจากนี้พบผู้ที่ตรวจเจอเชื้อไวรัสก่อโรคมามากกว่า 1 ชนิด จำนวน 27 ราย เมื่อพิจารณาการตรวจพบเชื้อจำแนกตามกลุ่มอายุเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี (39/75, 52.00%) กลุ่มอายุ 10-14 ปี (18/40, 45.00%) กลุ่มอายุ 25 – 59 ปี (15/34, 44.12%) กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี (112/293, 38.23%) และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (6/36, 16.67%) โดยกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ส่งตรวจจำนวน 6 ราย ยังตรวจไม่พบเชื้อ

ผลการตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกตามเชื้อที่พบ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2568

โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ	จำนวนที่ส่งตรวจ (ราย)	จำนวนที่ตรวจพบเชื้อ (ราย)	% Positive	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ)						
				Norovirus GI	Norovirus GII	Rotavirus	Adenovirus	Astrovirus	Sapovirus	พบไวรัสมากกว่า 1 ชนิด
รวม	484	190	39.26	6 (3.16)	60 (31.58)	60 (31.58)	11 (5.79)	16 (8.42)	10 (5.26)	27 (14.21)
แม่จัน	171	61	35.67	2	29	15	4	3	1	7
วชิระภูเก็ต	122	55	45.08	2	14	15	6	4	2	12
ตรัง	101	36	35.64	2	3	15	1	4	3	8
พระปกเกล้า	31	8	25.81	0	2	2	0	1	3	0
สันป่าตอง	25	14	56.00	0	1	12	0	0	1	0
พระนครศรีอยุธยา	9	3	33.33	0	2	0	0	1	0	0
มหาวิทยาลัยศรีธรรมราช	9	5	55.56	0	1	1	0	3	0	0
นครพนม	6	4	66.67	0	4	0	0	0	0	0
พระนครศรีอยุธยา	3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
ประจวบคีรีขันธ์	1	1	100	0	1	0	0	0	0	0
เสนา	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
ราชบุรี	4	3	75.00	0	3	0	0	0	0	0
มหาสารคาม	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0



ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน “ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2568”

- มีตัวอย่างส่งตรวจจำนวน 38 ตัวอย่าง จากโรงพยาบาลเครือข่าย 4 แห่ง ได้แก่
 - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต จำนวน 19 ราย
 - โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย จำนวน 15 ราย
 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี จำนวน 3 ราย
 - โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง จำนวน 1 ราย
- เพศหญิง 16 ราย และเพศชาย 22 ราย
- ค่ามัธยฐานอายุของผู้ป่วยที่ส่งตรวจเท่ากับ 2 ปี (อายุ 1 เดือน – 80 ปี)
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.84)
- เชื้อที่พบมากที่สุด คือ **Rotavirus** ร้อยละ 57.14

ร้อยละของตัวอย่างที่ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกตามเชื้อที่พบ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2568 (N = 14)

เชื้อที่พบ	จำนวน (ร้อยละ)
1. Rotavirus	8 (57.14)
2. Norovirus GII	2 (14.29)
3. Adenovirus	2 (14.29)
4. Norovirus GII + Adenovirus	2 (14.29)



ผู้เรียบเรียง : กาญจนา เมณฑกุล, ภาวิณี ดั่งเงิน, ชญานิฉ มหาลิงห์

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



02 590 3900



doe_cd@ddc.mail.go.th