




รายงาน ณ วันที่ 23 เมษายน 2568

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินโครงการพัฒนาการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อตรวจจับและตอบโต้การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศไทย (Flu-RightSize) โดยจัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก นครพนม จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ระนอง และ สุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC) ดำเนินการเฝ้าระวังโดยการเก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มาโรงพยาบาลด้วยกลุ่มอาการ Influenza-like illness (ILI) และ Severe acute respiratory infection (SARI) จำนวน 120 - 200 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ซึ่งครอบคลุมเชื้อไวรัส Influenza A/H1N1, A/H3, B, RSV and SARs-CoV-2

กราฟเส้นแสดงร้อยละของไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี และโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 19 เมษายน 2568



เชื้อสาเหตุที่พบบ่อย สัปดาห์ที่ 15-16 ปี 2568 (ระหว่างวันที่ 6-19 เม.ย. 2568)

Pathogens detection (N=102)	Total, n (%)
Positive	2 (2)
Influenza	2 (2)
- Influenza A/H1N1	1 (50)
- Influenza A H3	0 (0)
- Influenza B	1 (50)
Respiratory Syncytial Virus A+B	0 (0)
SARS-CoV-2	0 (0)

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของชนิดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี และโควิด 19 ที่พบในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับไว้ในโรงพยาบาล (SARI) (N=48) จำแนกตามกลุ่มอายุ ข้อมูลสัปดาห์ที่ 15-16 ปี 2568 (ระหว่างวันที่ 6-19 เม.ย. 2568)

age group (Year)	SARI, n (%)	Influenza vaccine of SARI, n (%)	pathogen detected			Influenza detected by type/subtypes (N=7)		
			Influenza, n (%)	SARs-CoV-2, n (%)	RSV, n (%)	A/H1N1, n (%)	A/H3, n (%)	Flu B, n (%)
<5	31 (65)	3 (50)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
5-17	5 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
18-64	6 (13)	1 (17)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
≥ 65	6 (13)	2 (33)	1 (100)	0 (0)	0 (0)	1 (100)	0 (0)	0 (0)
total	48 (100)	6 (100)	1 (100)	0 (0)	0 (0)	1 (100)	0 (0)	0 (0)

* ผู้ป่วย 1 ราย สามารถตรวจพบเชื้อได้มากกว่า 1 เชื้อ

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโครงการ Flu-RightSize ระหว่างสัปดาห์ที่ 15-16 (วันที่ 6-19 เมษายน 2568) พบว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 102 ราย ตรวจพบเชื้อจำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 โดยเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งสองราย ได้แก่ สายพันธุ์ A/H1N1 1 ราย และ B 1 ราย เมื่อพิจารณาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (SARI) จำนวน 48 ราย (47%) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี 31 ราย (65%) รองลงมาคือ กลุ่ม 18-17 ปี และอายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มละ 6 ราย และกลุ่ม 5-17 ปี 5 ราย ตามลำดับ โดยในกลุ่มผู้ป่วยอาการรุนแรงที่ตรวจพบเชื้อ 1 ราย ตรวจพบเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A/H1N1 แม้ว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จะมีแนวโน้มลดลง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำการตรวจคัดกรองและแยกผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานที่ยุคนิยม เช่น ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก โรงเรียน และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการระบาด รวมทั้งส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบมากในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง