




รายงาน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อตรวจจับและตอบโต้การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศไทย (Flu-RightSize) โดยจัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก นครพนม จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร หนอง และสุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC)

ดำเนินการเฝ้าระวังโดยการเก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มาโรงพยาบาลด้วยกลุ่มอาการ Influenza-like illness (ILI) และ Severe acute respiratory infection (SARI) จำนวน 120 - 200 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ตรวจหาเชื้อโดยวิธี PCR ด้วยชุดตรวจ Multiplex PCR respiratory panel ซึ่งครอบคลุมเชื้อ 23 ชนิด*
[*Influenza A, A/H1N1 pdm2009, A/H1, A/H3, B, Coronavirus 4 strains, SARS-CoV-2, RSV, HMPV, Adenovirus, Parainfluenza virus 1,2,3,4, Bocavirus, Rhinovirus/Enterovirus and Bacteria (M. pneumoniae, L. pneumophila, B. pertussis, C. pneumoniae) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568]

กราฟเส้นแสดงร้อยละของไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี และโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 3 พฤษภาคม 2568



เชื้อสาเหตุที่พบบ่อย สัปดาห์ที่ 17-18 ปี 2568
(ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. – 3 พ.ค. 2568)

Pathogens detection (N=187)	Total, n (%)
Positive	22 (12)
Influenza	17 (9)
- Influenza A/H1N1	11 (65)
- Influenza A H3	6 (35)
- Influenza B	0 (0)
Respiratory Syncytial Virus A+B	0 (0)
SARS-CoV-2	0 (0)
Bocavirus	3 (2)
Coronavirus oc43	1 (1)
Coronavirus hku1	1 (1)

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของชนิดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี และโควิด 19 ที่พบในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับไว้ในโรงพยาบาล (SARI) (N=80) จำแนกตามกลุ่มอายุ ข้อมูลสัปดาห์ที่ 17-18 ปี 2568 (ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. – 3 พ.ค. 2568)

age group (Year)	SARI, n (%)	Influenza vaccine of SARI, n (%)	pathogen detected			Influenza detected by type/subtypes (N=3)		
			Influenza, n (%)	SARs-CoV-2, n (%)	RSV, n (%)	A/H1N1, n (%)	A/H3, n (%)	Flu B, n (%)
<5	38 (48)	4 (40)	2 (67)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (67)	0 (0)
5-17	16 (20)	1 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
18-64	17 (21)	2 (20)	1 (33)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (33)	0 (0)
≥ 65	9 (11)	3 (30)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
total	80 (100)	10 (100)	3 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (100)	0 (0)

* ผู้ป่วย 1 ราย สามารถตรวจพบเชื้อได้มากกว่า 1 เชื้อ

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโครงการ Flu-RightSize ระหว่างสัปดาห์ที่ 17-18 (วันที่ 20 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2568) พบว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ซึ่งโครงการได้มีการส่งตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม ผลพบเชื้อ Bocavirus และ Coronavirus โดยจากตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 187 ราย ตรวจพบเชื้อจำนวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 17 ราย (9%) Bocavirus 3 ราย (2%) และ Coronavirus 2 ราย เมื่อพิจารณาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (SARI) จำนวน 80 ราย (43%) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี 38 ราย (48%) รองลงมาคือ กลุ่ม 18 - 64 ปี 17 ราย (21%) กลุ่ม 5 - 17 ปี 16 ราย (20%) และอายุ 65 ปีขึ้นไป 9 ราย (11%) ตามลำดับ โดยมีผลตรวจพบเชื้อ 3 ราย ซึ่งพบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A/H3 ทั้งหมด

มาตรการที่ควรดำเนินการในช่วงนี้คือ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำให้สถานศึกษา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ค่ายทหาร และเรือนจำ ตรวจคัดกรองและแยกผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี