

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568 เวลา 10.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดจากไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) อาการของผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ส่วนอาการอื่นๆ ที่พบ ได้แก่ มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ท้องร่วง มีภาวะเสียการรับรู้กลิ่นและการรับรู้รส แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรง แต่มีบางส่วนที่อาการหนักต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคที่ได้รับ อายุ โรคประจำตัว และระดับภูมิคุ้มกันโรคของผู้ป่วย โดยในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงและการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตได้

ข้อมูลจากรายงานระบบเฝ้าระวังโรค (Digital Disease Surveillance, DDS) กองระบาดวิทยา ปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 4 มิถุนายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568 เวลา 10.30 น.) พบแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยสะสม 333,844 ราย (อัตราป่วย 514.30 ต่อประชากรแสนคน) กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 0-4 ปี (865.23) รองลงมา 30-39 ปี (722.72) และ 20-29 ปี (662.01) ตามลำดับ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (2,008.47) รองลงมา ชลบุรี (1,692.93) และระยอง (1,388.82) ตามลำดับ สำหรับผู้เสียชีวิตพบจำนวนสะสม 73 ราย (อัตราตาย 0.11 ต่อประชากรแสนคน) คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.02 กลุ่มอายุที่พบอัตราตายต่อแสนประชากรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 60 ปีขึ้นไป (0.48) รองลงมา 30-39 ปี (0.054) และ 50-59 ปี (0.041) ตามลำดับ พื้นที่ที่พบรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 24 ราย รองลงมา ชลบุรี 8 ราย และจันทบุรี 7 ราย ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานเหตุการณ์การระบาดแบบกลุ่มก้อนของโรค COVID-19 จากโปรแกรมการตรวจสอบข่าวการระบาด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 4 มิถุนายน 2568 สถานที่ที่มีรายงานการระบาดแบบกลุ่มก้อนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานศึกษา เรือนจำ และค่ายทหาร เนื่องจากมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้มากกว่าสถานที่อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568 ตามวันที่รายงาน



ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568 เวลา 10.30 น.

สรุปและคำแนะนำ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2568 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 16 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) และตั้งแต่สัปดาห์ที่ 19 พบจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี รวมถึงสูงกว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 และมีการรายงานผู้เสียชีวิตทุกสัปดาห์โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป การระบาดแบบกลุ่มก้อนมักพบในสถานที่ที่คนรวมตัวกันจำนวนมาก จากข้อมูลดังกล่าวจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานระดับพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่หรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มหนาแน่น เช่น ในสถานศึกษาและเรือนจำ กรณีสถานศึกษาควรเน้นย้ำการคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้า หากพบมีอาการระบบทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัย และแจ้งผู้ปกครองพาไปรับการรักษา ส่วนเรือนจำควรเน้นย้ำการคัดกรองผู้มีการทางเดินหายใจและรับแยกผู้ป่วย หรือหากพบเป็นกลุ่มก้อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที รวมถึงเน้นย้ำมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด โดยที่หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก มีความแออัด ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกไปในที่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ปิด หรือ สถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี และล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ข้างนอกบ้าน หรือหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ

สรุปสถานการณ์ : กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค