

Checklist ฝีดาษวานร (Mpox) สำหรับประชาชน

คุณมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด หรือ มีเพศสัมพันธ์ กับผู้ป่วยสงสัยฝีดาษวานร หรือ ผู้ป่วยฝีดาษวานร หรือ มีฝิ่น/ตุ่มสงสัยฝีดาษวานร

- () นั่งชิดติดกับผู้ป่วย ผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยฝีดาษวานรโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงหน้ากากอนามัย
- () พุดคุยในระยะ 1 เมตร โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงหน้ากากอนามัยในสถานที่ปิด
- () ดูแลผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยฝีดาษวานรขณะป่วย
- () ทำความสะอาดห้องหรือใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยฝีดาษวานรขณะผู้ป่วยมีอาการ
- () มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยฝีดาษวานรทางช่องทางดังต่อไปนี้ อวัยวะสืบพันธุ์ ทวารหนัก หรือปาก

สังเกตอาการ ภายหลังจากสัมผัสผู้ป่วยภายใน 21 วัน

- () ไข้ () ปวดศีรษะ () ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือ ปวดหลัง
- () ต่อมน้ำเหลืองบริเวณโต บริเวณหลังหู คอ ขาหนีบ
- () เจ็บคอ คัดจมูก หรือ ไอ
- () ฝื่น หรือ ตุ่มน้ำ หรือ ตุ่มหนองขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก หรือ บริเวณรอบๆ
- () ฝื่น หรือ ตุ่มน้ำ หรือ ตุ่มหนองขึ้นตามมือ เท้า หน้าอก ใบหน้า หรือบริเวณปาก

รูปภาพฝิ่น ตุ่มฝีดาษวานร

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



ที่มาภาพจาก www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html

* 1 - 8 Photo credit : UK Health Security Agency

** 9 - 10 Photo credit : NHS England High Consequence Infectious Diseases Network