รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2565
ประจำสัปดาห์ที่ 7 (13–19 กุมภาพันธ์ 2565)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–19 กุมภาพันธ์ 2565 มีรายงานผู้ป่วย 660 ราย อัตราป่วย 1.00 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยยังคงมีแนวโน้มลดลง ดังรูปที่ 1

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564, 2565 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0–4 ปี เท่ากับ 8.02 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5–14 ปี (1.54) และกลุ่มอายุ 15–24 ปี (0.82) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–19 กุมภาพันธ์ 2565

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคเหนือ เท่ากับ 2.19 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.01) ภาคใต้ (0.91) และภาคกลาง (0.38) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ เชียงราย อัตราป่วย 8.56 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ นราธิวาส (6.81) พิษณุโลก (4.95) น่าน (3.99) สุโขทัย (3.92) อุบลราชธานี (3.00) อุตรดิตถ์ (2.68) ศรีสะเกษ (2.67) แพร่ (2.29) และมหาสารคาม (2.10) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	เชียงราย	8.56
2	นราธิวาส	6.81
3	พิษณุโลก	4.95
4	น่าน	3.99
5	สุโขทัย	3.92
6	อุบลราชธานี	3.00
7	อุตรดิตถ์	2.68
8	ศรีสะเกษ	2.67
9	แพร่	2.29
10	มหาสารคาม	2.10

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม–19 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–19 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,146 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.17 ในสัปดาห์ที่ 7 (ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์–19 กุมภาพันธ์ 2565) ได้รับตัวอย่างส่งตรวจทั้งสิ้น 125 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง พบให้ผลลบต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 119 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 6 ราย จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 125 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4

แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563–19 กุมภาพันธ์ 2565

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–19 กุมภาพันธ์ 2565 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 2 เหตุการณ์ จากจังหวัดปัตตานี ในสัปดาห์ที่ 7 (ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์–19 กุมภาพันธ์ 2565) ไม่มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังรูปที่ 5

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564–19 กุมภาพันธ์ 2565

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา