


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568 ประจำสัปดาห์ที่ 1 (1 – 4 มกราคม 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–4 มกราคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย 6,643 ราย อัตราป่วย 10.23 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2567) แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 26.95 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 5-9 ปี (24.31) และอายุ 10-14 ปี (13.99) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 4 มกราคม 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 14.22 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (11.97) ภาคใต้ (10.23) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5.19) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ลำพูน อัตราป่วย 42.37 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (31.36) กรุงเทพมหานคร (26.62) เชียงใหม่ (25.59) พะเยา (23.92) สมุทรปราการ (20.33) นนทบุรี (19.88) ลำปาง (19.51) เชียงราย (18.28) และสงขลา (17.47) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ลำพูน	42.37
2	ภูเก็ต	31.36
3	กรุงเทพมหานคร	26.62
4	เชียงใหม่	25.59
5	พะเยา	23.92
6	สมุทรปราการ	20.33
7	นนทบุรี	19.88
8	ลำปาง	19.51
9	เชียงราย	18.28
10	สงขลา	17.47

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-4 มกราคม 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-4 มกราคม 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 45 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 60.00) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 40.00) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 45 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567–4 มกราคม 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–4 มกราคม 2568) ไม่พบเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 4 มกราคม 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา