


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568 ประจำสัปดาห์ที่ 10 (2 – 8 มีนาคม 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย 195,428 ราย อัตราป่วย 301.07 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 23 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (7 ราย) จังหวัดฉะเชิงเทรา ลำปาง และสระแก้ว (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สงขลา สระบุรี สุราษฎร์ธานี ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช และนครปฐม จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 22 ราย และไม่ระบุสายพันธุ์ (1 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 1,074.57 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (812.11) และอายุ 10-14 ปี (772.21) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคเหนือ เท่ากับ 347.65 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคกลาง (337.74) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (284.53) และภาคใต้ (193.82) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ลำพูน อัตราป่วย 789.82 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พะเยา (729.90) ภูเก็ต (586.75) เชียงใหม่ (571.53) น่าน (568.59) เชียงราย (550.83) กรุงเทพมหานคร (467.23) อุบลราชธานี (450.53) ตราด (443.14) และลำปาง (439.21) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ลำพูน	789.82
2	พะเยา	729.90
3	ภูเก็ต	586.75
4	เชียงใหม่	571.53
5	น่าน	568.59
6	เชียงราย	550.83
7	กรุงเทพมหานคร	467.23
8	อุบลราชธานี	450.53
9	ตราด	443.14
10	ลำปาง	439.21

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย
เฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 8 มีนาคม 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,007 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 242 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.58 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 102 ราย (ร้อยละ 42.15) ชนิด B จำนวน 84 ราย (ร้อยละ 34.71) และชนิด A/H3N2 จำนวน 56 ราย (ร้อยละ 23.14) ในสัปดาห์ที่ 10 (ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 8 มีนาคม 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 105 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 8 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.90 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 60.87) ชนิด B จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 26.09) และชนิด A/H3N2 จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 13.04) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 105 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับการมหาวิทยาลัยการแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 8 มีนาคม 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 8 มีนาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 29 เหตุการณ์ จากจังหวัดชัยภูมิ 4 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และยโสธร จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดสงขลา นครราชสีมา และศรีสะเกษ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ ตราด นครนายก นนทบุรี ปัตตานี อุดรธานี สุโขทัย กาฬสินธุ์ สระบุรี ลำปาง เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และอุทัยธานี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 10 (ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 8 มีนาคม 2568) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 3 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 8 มีนาคม 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา