


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568 ประจำสัปดาห์ที่ 11 (9 – 15 มีนาคม 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 มีนาคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย 224,122 ราย อัตราป่วย 345.27 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 24 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (7 ราย) จังหวัดสระแก้ว (3 ราย) จังหวัดฉะเชิงเทรา และลำปาง (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สงขลา สระบุรี สุราษฎร์ธานี ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช และนครปฐม จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 23 ราย และไม่ระบุสายพันธุ์ (1 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 1,235.25 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (946.89) และอายุ 10-14 ปี (857.77) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 มีนาคม 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 394.37 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (377.69) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (332.35) และภาคใต้ (217.12) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ลำพูน อัตราป่วย 846.56 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พะเยา (749.25) ภูเก็ต (647.99) น่าน (627.60) เชียงใหม่ (621.16) เชียงราย (567.99) กรุงเทพมหานคร (531.76) อุบลราชธานี (510.53) ตราด (507.89) และนครราชสีมา (506.51) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ลำพูน	846.56
2	พะเยา	749.25
3	ภูเก็ต	647.99
4	น่าน	627.60
5	เชียงใหม่	621.16
6	เชียงราย	567.99
7	กรุงเทพมหานคร	531.76
8	อุบลราชธานี	510.53
9	ตราด	507.89
10	นครราชสีมา	506.51

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-15 มีนาคม 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568-15 มีนาคม 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,115 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.90 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 119 ราย (ร้อยละ 43.59) ชนิด B จำนวน 91 ราย (ร้อยละ 33.33) และชนิด A/H3N2 จำนวน 63 ราย (ร้อยละ 23.08) ในสัปดาห์ที่ 11 (ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม-15 มีนาคม 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 108 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 8 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.44 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 66.67) ชนิด B จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 23.81) และชนิด A/H3N2 จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 9.52) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 108 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567–15 มีนาคม 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568–15 มีนาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 30 เหตุการณ์ จากจังหวัดชัยภูมิ และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดยโสธร 3 เหตุการณ์ จังหวัดสงขลา นครราชสีมา และศรีสะเกษ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ ตราด นครนายก นนทบุรี ปัตตานี อุตรธานี สุโขทัย กาฬสินธุ์ สระบุรี ลำปาง เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และอุทัยธานี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 11 (ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม–15 มีนาคม 2568) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567-15 มีนาคม 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา