รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2565
ประจำสัปดาห์ที่ 35 (28 สิงหาคม–3 กันยายน 2565)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–3 กันยายน 2565 มีรายงานผู้ป่วย 22,922 ราย อัตราป่วย 34.64 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วยตาย 0.004 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ยังต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564, 2565 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0–4 ปี เท่ากับ 145.18 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5–14 ปี (60.76) และกลุ่มอายุ 15–24 ปี (43.19) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–3 กันยายน 2565

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 51.27 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคใต้ (50.13) ภาคเหนือ (33.88) และภาคกลาง (12.38) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ อุดรธานี อัตราป่วย 536.23 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ นราธิวาส (150.08) พะเยา (120.04) พัทลุง (102.49) เชียงราย (96.71) ภูเก็ต (86.64) ยะลา (73.49) อุบลราชธานี (62.86) ตาก (50.00) และสงขลา (48.17) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	อุดรธานี	536.23
2	นราธิวาส	150.08
3	พะเยา	120.04
4	พัทลุง	102.49
5	เชียงราย	96.71
6	ภูเก็ต	86.64
7	ยะลา	73.49
8	อุบลราชธานี	62.86
9	ตาก	50.00
10	สงขลา	48.17

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม–3 กันยายน 2565

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–3 กันยายน 2565 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 6,450 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.87 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 171 ราย (ร้อยละ 92.43) ชนิด B จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 7.03) และชนิด A/H1N1(2009) 1 ราย (ร้อยละ 0.54) ในสัปดาห์ที่ 35 (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม–3 กันยายน 2565) ได้รับตัวอย่างส่งตรวจทั้งสิ้น 200 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 14 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.50 แยกเป็นชนิด A/H3N2 33 ตัวอย่าง (ร้อยละ 94.29) และชนิด B 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.71) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 200 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4

แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563–3 กันยายน 2565

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–3 กันยายน 2565 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 9 เหตุการณ์ จากจังหวัดปัตตานี เชียงใหม่ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดลำปาง นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 35 (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม–3 กันยายน 2565) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน 2 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 29 ราย เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ด้วยอาการไข้ ไอ ปวดศีรษะ และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี RT–PCR จำนวน 11 ราย ส่งตรวจภายใต้โครงการ FLU DARRT ผลพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A ทั้ง 11 ราย (ร้อยละ 100)

เหตุการณ์ที่ 2 ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 114 ราย เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอ และเจ็บคอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี RT–PCR จำนวน 7 ราย ส่งตรวจภายใต้โครงการ FLU DARRT ผลพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 5 ราย (ร้อยละ 71.43)

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564–3 กันยายน 2565

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา