


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568 ประจำสัปดาห์ที่ 4 (19-25 มกราคม 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 มกราคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย 51,149 ราย อัตราป่วย 78.80 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย จากจังหวัดนครราชสีมา 3 ราย จังหวัดสุรินทร์ แม่ฮ่องสอน และลำปาง จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A ทั้ง 6 ราย สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 270.24 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (210.70) และอายุ 10-14 ปี (172.35) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 มกราคม 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคเหนือ เท่ากับ 108.06 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคกลาง (100.58) ภาคใต้ (63.35) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (47.43) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา อัตราป่วย 272.30 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ลำพูน (230.99) เชียงใหม่ (214.35) ภูเก็ต (200.03) เชียงราย (199.75) ลำปาง (193.41) กรุงเทพมหานคร (180.75) นนทบุรี (141.27) สมุทรปราการ (113.27) และปทุมธานี (109.36) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	พะเยา	272.30
2	ลำพูน	230.99
3	เชียงใหม่	214.35
4	ภูเก็ต	200.03
5	เชียงราย	199.75
6	ลำปาง	193.41
7	กรุงเทพมหานคร	180.75
8	นนทบุรี	141.27
9	สมุทรปราการ	113.27
10	ปทุมธานี	109.36

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 25 มกราคม 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 มกราคม 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 367 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.62 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 29 ราย (ร้อยละ 47.54) ชนิด A/H3N2 จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 29.51) และชนิด B จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 22.95) ในสัปดาห์ที่ 4 (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 25 มกราคม 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 112 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 8 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.64 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 11 ราย (ร้อยละ 50.00) ชนิด B จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 27.27) และชนิด A/H3N2 จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 22.73) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 112 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Department of Disease Control, Ministry of Public Health

แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567-25 มกราคม 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 มกราคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 3 เหตุการณ์ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 เหตุการณ์ และปัตตานี 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 4 (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม- 25 มกราคม 2568) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567–25 มกราคม 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา