


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568

ประจำสัปดาห์ที่ 40 (28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 4 ตุลาคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย 692,383 ราย อัตราป่วย 1,066.65 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 75 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (20 ราย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (5 ราย) จังหวัดพิษณุโลก และบุรีรัมย์ (4 ราย) จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ลำปาง และสมุทรปราการ (3 ราย) จังหวัดสงขลา นครสวรรค์ ยะลา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี กาฬสินธุ์ และภูเก็ต (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สระบุรี ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ นนทบุรี ตรัง อุตรธานี ปัตตานี สิงห์บุรี สมุทรสาคร และยโสธร จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 64 ราย สายพันธุ์ B (9 ราย) และไม่ระบุสายพันธุ์ (2 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สูงกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2567) และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 3,729.31 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (2,935.19) และอายุ 10-14 ปี (2,523.33) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 4 ตุลาคม 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 1,492.95 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (876.56) ภาคใต้ (821.95) และภาคเหนือ (792.44) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต อัตราป่วย 2,588.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ชลบุรี (2,099.18) ตรัง (1,975.07) กรุงเทพมหานคร (1,970.68) จันทบุรี (1,802.56) ระยอง (1,799.10) นนทบุรี (1,680.27) สมุทรปราการ (1,644.88) นครปฐม (1,469.06) และปทุมธานี (1,457.34) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



Rate/100,000 pop.

= 1,000.01 ขึ้นไป
= 750.01-1,000.00
= 500.01-750.00
= 250.01-500.00
= 0.00 - 250.00

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ภูเก็ต	2,588.26
2	ชลบุรี	2,099.18
3	ตราด	1,975.07
4	กรุงเทพมหานคร	1,970.68
5	จันทบุรี	1,802.56
6	ระยอง	1,799.10
7	นนทบุรี	1,680.27
8	สมุทรปราการ	1,644.88
9	นครปฐม	1,469.06
10	ปทุมธานี	1,457.34

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 4 ตุลาคม 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 4 ตุลาคม 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 5,706 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 849 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.88 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 355 ราย (ร้อยละ 41.81) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 299 ราย (ร้อยละ 35.22) และชนิด B จำนวน 195 ราย (ร้อยละ 22.97) ในสัปดาห์ที่ 40 (ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 208 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.44 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 44 ราย (ร้อยละ 80.00) ชนิด B จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 14.55) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 5.45) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 208 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับการมหาวิทยาลัยการแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 4 ตุลาคม 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 4 ตุลาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 75 เหตุการณ์ จากจังหวัดอุดรธานี 6 เหตุการณ์ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร 5 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชลบุรี และยโสธร จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ กระบี่ สระบุรี และสุรินทร์ จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดสงขลา อุทัยธานี พิจิตรโลก นครสวรรค์ อุบลราชธานี และเพชรบูรณ์ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดตราด นครนายก นนทบุรี ปัตตานี สุโขทัย กาฬสินธุ์ ลำปาง นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ชัยนาท สมุทรปราการ ลพบุรี และร้อยเอ็ด จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 40 (ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2568) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS) กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 4 ตุลาคม 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา