


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2565 ประจำสัปดาห์ที่ 43 (23–29 ตุลาคม 2565)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–29 ตุลาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วย 58,151 ราย อัตราป่วย 87.88 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วยตาย 0.004 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่สัปดาห์ที่ 40 จำนวนผู้ป่วยเริ่มสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564, 2565
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0–4 ปี เท่ากับ 379.02 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5–14 ปี (227.15) และกลุ่มอายุ 15–24 ปี (107.10) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 ตุลาคม 2565

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคเหนือ เท่ากับ 122.56 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคใต้ (115.44) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (86.31) และภาคกลาง (58.90) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ อุตรดิตถ์ อัตราป่วย 550.24 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พะเยา (277.32) นราธิวาส (275.36) เชียงราย (254.50) พัทลุง (178.64) เชียงใหม่ (174.37) หนองคาย (165.04) น่าน (152.89) ภูเก็ต (152.82) และตราด (152.67) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	อุดรธานี	550.24
2	พะเยา	277.32
3	นราธิวาส	275.36
4	เชียงราย	254.50
5	พัทลุง	178.64
6	เชียงใหม่	174.37
7	หนองคาย	165.04
8	น่าน	152.89
9	ภูเก็ต	152.82
10	ตราด	152.67

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-29 ตุลาคม 2565

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 ตุลาคม 2565 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 7,835 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 405 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.17 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 383 ราย (ร้อยละ 94.57) ชนิด B จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 5.19) และชนิด A/H1N1 (2009) 1 ราย (ร้อยละ 0.24) ในสัปดาห์ที่ 43 (ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม-29 ตุลาคม 2565) ได้รับตัวอย่างส่งตรวจทั้งสิ้น 124 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.06 พบเป็นชนิด A/H3N2 6 ราย (ร้อยละ 60.00) และชนิด B 4 ราย (ร้อยละ 40.00) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 124 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563–29 ตุลาคม 2565

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–29 ตุลาคม 2565 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 25 เหตุการณ์ จากจังหวัด เชียงใหม่ 3 เหตุการณ์ จังหวัดปัตตานี สุโขทัย ชลบุรี พิจิตร โลก กระบี่ และตาก จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดตรัง นครสวรรค์ ลำปาง สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ หนองคาย อุดรธานี ยโสธร อุบลราชธานี และเพชรบุรี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 43 (ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม–29 ตุลาคม 2565) มีรายงานเหตุการณ์ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 5 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5 รายละเอียดดังนี้


เหตุการณ์ที่ 1 ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 119 ราย จากจังหวัดยโสธร เริ่มพบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ และปวดกล้ามเนื้อ เก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 5 ราย ผลตรวจพบเชื้อ Influenza A/H3 จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 100)

เหตุการณ์ที่ 2 ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 107 ราย จากจังหวัดกระบี่ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ด้วยอาการมีน้ำมูก ปวดศีรษะ มีไข้ หนาวสั่น และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 10 ราย ผลตรวจพบเชื้อ Influenza B จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 70)

เหตุการณ์ที่ 3 ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 169 ราย จากจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มพบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ด้วยอาการไข้ เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 5 ราย ผลตรวจพบเชื้อ Influenza A/H3 จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 100)

เหตุการณ์ที่ 4 ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 109 ราย จากจังหวัดตาก เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ด้วยอาการไข้ หนาวสั่น และปวดเมื่อยตามตัว เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี Rapid test for influenza จำนวน 4 ราย ผลตรวจพบเชื้อ Influenza A จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 100)

เหตุการณ์ที่ 5 ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 25 ราย จากจังหวัดเพชรบุรี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ด้วยอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว คัดจมูก และไอ เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี Rapid test for influenza จำนวน 5 ราย ผลตรวจพบเชื้อ Influenza A จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 60)



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564–29 ตุลาคม 2565

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา