



รายงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568


กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อตรวจจับและตอบโต้การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศไทย (Flu-RightSize) โดยจัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก นครพนม จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC)

ดำเนินการเฝ้าระวังโดยการเก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มาโรงพยาบาลด้วยกลุ่มอาการ Influenza-like illness (ILI) และ Severe acute respiratory infection (SARI) จำนวน 120 - 200 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ตรวจหาเชื้อโดยวิธี PCR ด้วยชุดตรวจ Multiplex PCR respiratory panel ซึ่งครอบคลุมเชื้อ 23 ชนิด*

*Influenza A, A/H1N1 pdm2009, A/H1, A/H3, B, Coronavirus 4 strains, SARS-CoV-2, RSV, HMPV, Adenovirus, Parainfluenza virus 1,2,3,4, Bocavirus, Rhinovirus/Enterovirus and Bacteria (M. pneumoniae, L. pneumophila, B. pertussis, C. pneumoniae) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568]

กราฟเส้นแสดงร้อยละของไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี โควิด 19 และเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2568

Number of specimen collected and pathogen detected by weekly, Thailand, 2024-2025



เชื้อสาเหตุที่พบบ่อย สัปดาห์ที่ 23 - 24 (ระหว่างวันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2568)

Pathogens detection (N=194)	Total, n (%)
Positive	121 (62)
Influenza	9 (5)
SARS-CoV-2	36 (19)
RSV A/B	2 (1)
Rhinovirus/Enterovirus	51 (26)
Parainfluenza type 1-4	16 (8)
Bocavirus	5 (3)
HMPV A/B	3 (2)
Adenovirus	8 (4)
Coronavirus OC43	0 (0)
Coronavirus 229E	1 (1)
Coronavirus nl63	4 (2)
Coronavirus hku1	1 (1)

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของชนิดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี และโควิด 19 ที่พบในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับไว้ในโรงพยาบาล (SARI) (N=77) จำนวนตามกลุ่มอายุ ข้อมูลสัปดาห์ที่ 23 - 24 ปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2568)

Age group (Year)	SARI, n (%)	Influenza vaccine of SARI, n (%)	Pathogen detected						
			Influenza, n (%)				SARS-CoV-2, n (%)	RSV, n (%)	Others, n (%)
			A/H1N1	A/H3	B	Total			
<5	49 (64)	2 (25)	0	0	1 (100)	1 (33)	2 (50)	1 (50)	27 (77)
5-17	17 (22)	3 (38)	0	1 (50)	0 (0)	1 (33)	1 (25)	1 (50)	8 (23)
18-64	6 (8)	2 (25)	0	0	0 (0)	0	1 (25)	0 (0)	0 (0)
≥ 65	5 (6)	1 (13)	0	1 (50)	0 (0)	1 (33)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
total	77 (100)	8 (100)	0	2 (100)	1 (100)	3 (100)	4 (100)	2 (100)	35 (100)

* Others ประกอบด้วย Coronavirus 4 strains, HMPV, Adenovirus, Parainfluenza virus 1,2,3,4, Bocavirus, Rhinovirus/Enterovirus and Bacteria (M. pneumoniae, L. pneumophila, B. pertussis, and C. pneumoniae)

* ผู้ป่วย 1 ราย สามารถตรวจพบเชื้อได้มากกว่า 1 เชื้อ

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโครงการ Flu-RightSize ระหว่างสัปดาห์ที่ 23 - 24 (วันที่ 1-14 มิถุนายน 2568) พบว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 และโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บตัวอย่างจำนวน 194 ราย ผลตรวจพบเชื้อ 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 โดยพบเชื้อ Rhinovirus/Enterovirus มากที่สุด 51 ราย (26%) รองลงมาคือ SARS-CoV-2 36 ราย (19%) Parainfluenza type 1-4 16 ราย (8%) และเชื้อไข้หวัดใหญ่ 9 ราย (5%) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (SARI) จำนวน 77 ราย (40%) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี 49 ราย (64%) รองลงมาคือกลุ่ม 5 - 17 ปี 17 ราย (22%) กลุ่ม 18 - 64 ปี 6 ราย (2%) และอายุ 65 ปีขึ้นไป 5 ราย (6%) ตามลำดับ โดยตรวจพบเชื้อ Rhinovirus/Enterovirus มากที่สุดเช่นกัน จำนวน 24 ราย (31%) ตามด้วยเชื้อ Parainfluenza 10 ราย (13%) และ Adenovirus 7 ราย (9%)

เนื่องจากตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 และโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ กลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดเชื้อ Rhinovirus/Enterovirus ในกลุ่มเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ดังนั้นจึงควรติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดกลุ่มก้อนในกลุ่มเด็กเล็กและนักเรียน ตลอดจนการเน้นย้ำให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด