



รายงาน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568


กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อตรวจจับและตอบโต้การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศไทย (Flu-RightSize) โดยจัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก นครพนม จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC)

ดำเนินการเฝ้าระวังโดยการเก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มาโรงพยาบาลด้วยกลุ่มอาการ Influenza-like illness (ILI) และ Severe acute respiratory infection (SARI) จำนวน 120 - 200 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ตรวจหาเชื้อโดยวิธี PCR ด้วยชุดตรวจ Multiplex PCR respiratory panel ซึ่งครอบคลุมเชื้อ 23 ชนิด*

[*Influenza A, A/H1N1 pdm2009, A/H1, A/H3, B, Coronavirus 4 strains, SARS-CoV-2, RSV, HMPV, Adenovirus, Parainfluenza virus 1,2,3,4, Bocavirus, Rhinovirus/Enterovirus and Bacteria (M. pneumoniae, L. pneumophila, B. pertussis, C. pneumoniae) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568]

กราฟเส้นแสดงร้อยละของไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี โควิด 19 และเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 5 - 18 ตุลาคม 2568

Number of specimen collected and pathogen detected by weekly, Thailand, 2024-2025

เชื้อสาเหตุที่พบบ่อย สัปดาห์ที่ 41 - 42
(ระหว่างวันที่ 5 - 18 ตุลาคม 2568)

Pathogens detection (N=291)	Total, n (%)
Positive	203 (69.8)
- Influenza	76 (26.1)
- RSV A/B	45 (15.5)
- Rhinovirus/Enterovirus	40 (13.7)
- HMPV A/B	30 (10.3)
- Adenovirus	9 (3.1)
- Bocavirus	8 (2.7)
- Coronavirus nl63	7 (2.4)
- Parainfluenza type 1 - 4	6 (2.1)
- SARS-CoV-2	2 (0.7)
- Coronavirus 229E	0 (0)
- Coronavirus hku1	0 (0)
- Coronavirus OC43	0 (0)

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของชนิดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี และโควิด 19
ที่พบในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับไว้ในโรงพยาบาล (SARI) (N=148)
จำแนกตามกลุ่มอายุ ข้อมูลสัปดาห์ที่ 41 - 42 (5 - 18 ตุลาคม 2568)

Age group (Year)	SARI, n (%)	Influenza vaccine of SARI, n (%)	Pathogen detected						
			Influenza, n (%)				SARs-CoV- 2, n (%)	RSV, n (%)	Others, n (%)
			A/H1N1	A/H3	B	Total			
<5	85 (57.43)	2 (25)	2 (40)	5 (56)	3 (100)	10 (58.82)	1 (100)	20 (71.4)	37 (56.9)
5-17	35 (23.65)	2 (25)	1 (20)	2 (22)	0 (0)	3 (17.65)	0 (0)	5 (17.9)	21 (32.3)
18-64	15 (10.14)	0 (0)	2 (40)	2 (22)	0 (0)	4 (23.53)	0 (0)	3 (10.7)	3 (4.6)
≥ 65	13 (8.78)	4 (50)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (6.2)
total	148 (100)	8 (100)	5 (100)	9 (100)	3 (100)	17 (100)	1 (100)	28 (100)	65 (100)

* Others ประกอบด้วย Coronavirus 4 strains, HMPV, Adenovirus, Parainfluenza virus 1,2,3,4, Bocavirus, Rhinovirus/Enterovirus and Bacteria (M. pneumoniae, L. pneumophila, B. pertussis, and C. pneumoniae)
* ผู้ป่วย 1 ราย สามารถตรวจพบเชื้อได้มากกว่า 1 เชื้อ

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโครงการ Flu-RightSize ระหว่างสัปดาห์ 41 - 42 (5 - 18 ตุลาคม 2568) พบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บตัวอย่างจำนวน 291 ราย ผลตรวจพบเชื้อ 203 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.8 โดยพบเชื้อ Influenza มากที่สุด 76 ราย (26.1) รองลงมาคือ RSV A/B 45 ราย (15.5) Rhinovirus/Enterovirus 40 ราย (13.7) HMPV A/B 30 ราย (10.3) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (SARI) จำนวน 148 ราย (50.9) ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 85 ราย (57.43) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 17 ปี 35 ราย (23.65) กลุ่มอายุ 18 - 64 ปี 15 ราย (10.14) และกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป 13 ราย (8.78) โดยตรวจพบเชื้อ Rhinovirus/Enterovirus มากที่สุด 29 ราย (19.6) ตามด้วยเชื้อ RSV A/B 28 ราย (18.9) และ Influenza 17 ราย (11.5)

เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ ประชาชนควรดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การสวมหน้ากากอนามัย และการหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า เมื่อมีอาการป่วย ควรหยุดปฏิบัติงานหรือเรียนเพื่อพักรักษาตัวที่บ้าน ปิดปากและจมูกด้วยผ้าหรือทิชชูเวลาไอหรือจาม และทิ้งกระดาษทิชชูในถังขยะติดเชื้อ พร้อมเข้ารับการรักษาระบบปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและจำกัดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นในชุมชน