

รายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ปี 2568
ระหว่างสัปดาห์ที่ 43 - 44 (19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568)

รายงาน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568


กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อตรวจจับและตอบโต้การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศไทย (Flu-RightSize) โดยจัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก นครพนม จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC)

ดำเนินการเฝ้าระวังโดยการเก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มาโรงพยาบาลด้วยกลุ่มอาการ Influenza-like illness (ILI) และ Severe acute respiratory infection (SARI) จำนวน 120 - 200 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ตรวจหาเชื้อโดยวิธี PCR ด้วยชุดตรวจ Multiplex PCR respiratory panel ซึ่งครอบคลุมเชื้อ 23 ชนิด*

*Influenza A, A/H1N1 pdm2009, A/H1, A/H3, B, Coronavirus 4 strains, SARS-CoV-2, RSV, HMPV, Adenovirus, Parainfluenza virus 1,2,3,4, Bocavirus, Rhinovirus/Enterovirus and Bacteria (M. pneumoniae, L. pneumophila, B. pertussis, C. pneumoniae) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568]

กราฟเส้นแสดงร้อยละของไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี โควิด 19 และเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568

Number of specimen collected and pathogen detected by weekly, Thailand, 2024-2025



เชื้อสาเหตุที่พบบ่อย สัปดาห์ที่ 43 - 44

(ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568)

Pathogens detection (N=261)	Total, n (%)
Positive	186 (71.3)
- Influenza	71 (27.2)
- RSV A/B	44 (16.9)
- Rhinovirus/Enterovirus	31 (11.9)
- HMPV A/B	20 (7.7)
- Coronavirus hku1	12 (4.6)
- Bocavirus	11 (4.2)
- Coronavirus nl63	7 (2.7)
- Parainfluenza type 1 - 4	5 (1.9)
- Adenovirus	2 (0.8)
- SARS-CoV-2	2 (0.8)
- Coronavirus 229E	0 (0)
- Coronavirus OC43	0 (0)

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของชนิดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี และโควิด 19 ที่พบในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับไว้ในโรงพยาบาล (SARI) (N=136) จำแนกตามกลุ่มอายุ ข้อมูลสัปดาห์ที่ 43 - 44 (19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568)

Age group (Year)	SARI, n (%)	Influenza vaccine of SARI, n (%)	Pathogen detected						
			Influenza, n (%)				SARs-CoV- 2, n (%)	RSV, n (%)	Others, n (%)
			A/H1N1	A/H3	B	Total			
<5	82 (60.3)	7 (58.3)	1 (50)	4 (29)	0 (0)	5 (29.4)	0 (0)	23 (85.2)	38 (67.9)
5-17	26 (19.1)	1 (8.3)	1 (50)	4 (29)	1 (100)	6 (35.3)	0 (0)	2 (7.4)	11 (19.6)
18-64	18 (13.2)	1 (8.3)	0 (0)	5 (36)	0 (0)	5 (29.4)	0 (0)	1 (3.7)	6 (10.7)
≥ 65	10 (7.4)	3 (25)	0 (0)	1 (7)	0 (0)	1 (5.9)	0 (0)	1 (3.7)	1 (1.8)
total	136 (100)	12 (99.9)	2 (100)	14 (100)	1 (100)	17 (100)	0 (0)	27 (100)	56 (100)

* Others ประกอบด้วย Coronavirus 4 strains, HMPV, Adenovirus, Parainfluenza virus 1,2,3,4, Bocavirus, Rhinovirus/Enterovirus and Bacteria (M. pneumoniae, L. pneumophila, B. pertussis, and C. pneumoniae)

* ผู้ป่วย 1 ราย สามารถตรวจพบเชื้อได้มากกว่า 1 เชื้อ

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโครงการ Flu-RightSize ระหว่างสัปดาห์ที่ 43 - 44 (19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568) พบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บตัวอย่างจำนวน 261 ราย ผลตรวจพบเชื้อ 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.3 โดยพบเชื้อ Influenza มากที่สุด 71 ราย (27.2) รองลงมาคือ RSV A/B 44 ราย (16.9) Rhinovirus/Enterovirus 31 ราย (11.9) HMPV A/B 20 ราย (7.7) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (SARI) จำนวน 136 ราย (52.1) ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 82 ราย (60.3) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 17 ปี 26 ราย (19.1) กลุ่มอายุ 18 - 64 ปี 18 ราย (13.2) และกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป 10 ราย (7.4) โดยตรวจพบเชื้อ RSV A/B 28 มากที่สุด 27 ราย (19.9) รองลงมาคือเชื้อ Rhinovirus/Enterovirus 20 ราย (14.7) และ Influenza 17 ราย (12.6)

มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” และการฉีดวัคซีนประจำปี ยังคงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ หรือหอบเหนื่อย ให้รีบหยุดพักรักษาตัวทันทีและกักตัวอยู่บ้านเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อต่อ ควรปิดปากและจมูกให้มิดชิด ด้วยผ้าหรือทิชชูเวลาไอหรือจาม และทิ้งทิชชูที่ใช้แล้วลงถังขยะสำหรับเชื้อโรค หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและรับประทานยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด