รายงานสถานการณ์โรคไข้เหลืองในภูมิภาคอเมริกา

สรุปการรายงานสถานการณ์

ระหว่างสัปดาห์ระบาดวิทยาที่ 1 (เริ่มวันที่ 29 ธันวาคม 2567) ถึงสัปดาห์ที่ 17 ของปี พ.ศ. 2568 (สิ้นสุดวันที่ 26 เมษายน 2568) ภูมิภาคอเมริการายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้เหลืองจำนวนทั้งสิ้น 208 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate: CFR) ร้อยละ 40 ผู้ป่วยกระจายใน 5 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย บราซิล โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด คือ บราซิล (106 ราย) รองลงมา คือ โคลอมเบีย (60 ราย) และเปรู (35 ราย)

ในปี พ.ศ. 2567 การระบาดของโรคไข้เหลืองพบมากในพื้นที่ป่าดิบชื้นแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอน ขณะที่ในปี พ.ศ. 2568 มีแนวโน้มการแพร่กระจายสู่พื้นที่นอกเขตอเมซอน โดยเฉพาะในรัฐเซาเปาโลของบราซิล และแคว้นโตลิมาในโคลอมเบีย ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของโรค จากลักษณะเฉพาะถิ่นในป่าเข้าสู่เขตเมืองหรือพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นมากขึ้น

ข้อมูลรายประเทศ พบว่า โบลิเวียรายงานผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย โดย 1 รายเสียชีวิต และผู้เสียชีวิตไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน ขณะที่บราซิลมีผู้ป่วยกระจายใน 4 รัฐหลัก โดยรัฐเซาเปาโลพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีประวัติทำงานหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ป่า โคลอมเบียพบการระบาดต่อเนื่องในแคว้นโตลิมา โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีรายงานการตายของลิงที่เป็นสัตว์พาหะร่วมด้วย เอกวาดอร์รายงานผู้ป่วย 4 รายและเสียชีวิตทั้งหมด สะท้อนถึงความรุนแรงของโรค ส่วนเปรูพบผู้ป่วย 35 ราย โดยส่วนใหญ่ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน และมีประวัติสัมผัสพื้นที่ป่าเพื่อทำงานด้านเกษตรกรรม

องค์การอนามัยโลกได้จัดความเสี่ยงของโรคไข้เหลืองในประเทศในทวีปอเมริกาอยู่ระดับ “สูง” และยังประกอบกับการลดลงของความครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันพบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยถึงสามเท่าในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงถึงความจำเป็นของการเฝ้าระวังเชิงรุก การให้วัคซีนในวงกว้าง และการควบคุมยุงพาหะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบของโรคไข้เหลืองในภูมิภาคอเมริกา

ไข้เหลืองเป็นโรคที่แพร่โดยยุงและป้องกันได้ด้วยวัคซีน WHO แนะนำให้เฝ้าระวังเชิงรุก ตรวจผู้ป่วยสงสัยและประสานข้อมูลระหว่างประเทศ การฉีดวัคซีนเป็นวิธีหลักในการป้องกัน โดยควรรวมในแผนวัคซีนประจำสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนขึ้นไป พร้อมควบคุมยุงและให้ข้อมูลแก่ผู้เดินทาง ประเทศที่มีความเสี่ยงควรกำหนดให้ผู้เดินทางแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งให้ภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต และควรติดตามแนวทางล่าสุดจาก WHO อย่างใกล้ชิด

****

ที่มา : EIS | Event Information Site for IHR National Focal Points

จัดทำ : 22 พฤษภาคม 2568

เรียบเรียง : กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ กองระบาดวิทยา
จุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (IHR-NFP)