

#### สถานการณ์โรคหัด (Measles) ประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2568

#### กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

โรคหัด เกิดจากเชื้อไวรัส Measles ติดต่อกันโดยการไอ จาม หรือพูดคุยระยะใกล้ชิด แพร่กระจายได้ง่าย เมื่อผู้ป่วยหายใจหรือไอ จาม ละอองอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส ระยะฟักตัว 7 – 21 วัน (เฉลี่ยประมาณ 14 วัน) จากวันที่สัมผัสโรคจนถึงมีผื่นเกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ 4 วันก่อนผื่นขึ้น ไปจนถึงหลังผื่นขึ้นแล้ว 4 วัน อาการและการแสดงของโรค เริ่มด้วยมีไข้ น้ำมูกไหล มักจะไอแห้ง ๆ หลังจากนั้นจะมีไข้สูง ตาแดงและแฉะ อาจมีไข้สูงประมาณ 3 – 4 วัน จึงเริ่มมีผื่นขึ้นลักษณะผื่นนูนแดง (maculopapular rash) ติดกันเป็นปื้น ๆ ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและรุนแรงคือปอดอักเสบและสมองอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กเล็ก การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด IgM ต่อไวรัสหัดด้วยวิธี ELISA ให้เจาะเลือดเพียงครั้งเดียว ในช่วง 1 - 30 วันหลังผื่นขึ้น หรือเก็บตัวอย่างจาก throat swab หรือ nasal swab ตรวจหาสารพันธุกรรมหรือเพาะแยกเชื้อไวรัส โดยควรเก็บในช่วง 1 - 14 วันหลังผื่นขึ้น แนะนำให้ทำในกรณีเกิดการระบาด หรือเป็นผู้ป่วยรายแรกของพื้นที่

ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคหัดจากฐานข้อมูลโปรแกรมโรคกำกวมดล้า กรมควบคุมโรค ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 2 มิถุนายน 2568 พบว่ามีรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่นหรือสงสัยหัดทั้งสิ้น 1,123 ราย พบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคหัด 333 ราย (ร้อยละ 29.65) และมีประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 52 ราย (ร้อยละ 4.63) คิดเป็นอัตราป่วย 0.59 ต่อแสนประชากร และมีอาการเข้าได้กับโรคหัด 126 ราย (ร้อยละ 11.22) ผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 77 ราย (ร้อยละ 6.86) ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคหัดเยอรมัน 7 ราย (ร้อยละ 0.62) ผู้ป่วยที่ต้องตรวจสอบยืนยันทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งเนื่องจากผู้ป่วยมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหัดและหัดเยอรมัน 5 ราย (ร้อยละ 0.45) และผู้ป่วยที่ไม่ใช่หัด/ หัดเยอรมัน 523 ราย (ร้อยละ 46.57)

สำหรับสถานการณ์หัด พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยยืนยันหัดทางห้องปฏิบัติการและผู้ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 385 ราย พบว่ามีอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง คือ 1 : 1.08 ผู้ป่วยมีสัญชาติไทยร้อยละ 88.95 และไม่ใช่สัญชาติไทย ร้อยละ 11.05 ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติกัมพูชา (ร้อยละ 3.95) และเมียนมา (ร้อยละ 3.42) โดยผู้ป่วยที่ไม่ใช่สัญชาติไทยกระจายอยู่ในจังหวัด ดังนี้ กรุงเทพฯ (9), ประจวบคีรีขันธ์ (6), ระยอง (6), จันทบุรี (3), สงขลา (3), สระแก้ว (3), ชลบุรี (2), ฉะเชิงเทรา (2), สุราษฎร์ธานี (1), นครราชสีมา (1), ยะลา (1), ภูเก็ต (1), พระนครศรีอยุธยา (1) และอุดรธานี (1) มีรายงานผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารักษาในประเทศไทย (imported cases) ในจังหวัดตราด 3 ราย ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง แรกเกิด – 61 ปี (มัธยฐาน 5 ปี 9 เดือน) พบอัตราป่วยในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากที่สุด คิดเป็น 6.84 ต่อแสนประชากร โดยจังหวัดยะลามีอัตราป่วยสูงสุด 16.37 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ ปัตตานี และระนอง (11.80 และ 5.56 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ)


จากการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดของผู้ป่วย พบว่า ร้อยละ 49.35 ของผู้ป่วยไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ร้อยละ 37.20 ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในการรับวัคซีน ร้อยละ 5.01 เคยได้รับวัคซีน 2 ครั้ง ร้อยละ 4.75 เคยได้รับวัคซีน 1 ครั้ง และ ร้อยละ 3.69 เคยได้รับวัคซีนแต่ไม่ทราบจำนวนครั้ง

มีการรายงานผู้ป่วยยืนยันหัดใน 32 จังหวัด โดยในช่วงเดือนเมษายน 2568 จนถึง 26 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา พบว่าสัดส่วนการรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคหัด และ ผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาในพื้นที่นอก 4 จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มมากขึ้น โดยสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีเริ่มเห็นแนวโน้มได้ชัดเจนในสัปดาห์ที่ 11 ที่ร้อยละ 26.67 และสูงสุดในสัปดาห์ที่ 19 ที่ร้อยละ 83.33 (รูปที่ 3) ทั้งนี้พบผู้ป่วยกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะใน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (รูปที่ 5)

เมื่อพิจารณาสถานการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคหัด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 26 พฤษภาคม 2568 พบว่า มีรายงานผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน 20 เหตุการณ์ ในกรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ชัยภูมิ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา และสระแก้ว โดยเป็นการระบาดในโรงเรียน 8 เหตุการณ์ ชุมชน 4 เหตุการณ์ ครอบครัว 4 เหตุการณ์ สถานที่ทำงาน 3 เหตุการณ์ และเรือนจำ 1 เหตุการณ์


ข้อมูลจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อก่อโรคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ในปี 2567 ถึง 26 พฤษภาคม 2568 โดยปกติสายพันธุ์หัดที่ไหลเวียนในประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ สายพันธุ์ D8 แต่ในปี 2568 เริ่มพบสายพันธุ์ B3 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบในประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม กัมพูชา ออสเตรเลีย) โดยมีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อหัดสายพันธุ์ B3 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ตราน นครราชสีมา ระยอง สระแก้ว สุราษฎร์ธานี และพบการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ B3 ในผู้ป่วยจังหวัดสระแก้วและจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มสูงขึ้นที่ประเทศเวียดนาม และกัมพูชา (พฤษภาคม 2568)

รูปที่ 1 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยไข่ออกผื่น/สงสัยหัด จำแนกตามชนิดของผู้ป่วย และวันที่เริ่มป่วย รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 26 พฤษภาคม 2568




ที่มา: ฐานข้อมูลโปรแกรมโรคกำกวมดัดแปลง

รูปที่ 2 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยยืนยัน ผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา และผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหัด จากฐานข้อมูลการกำจัดโรคหัด (Measles online database) และรายงาน 506 (D506) จำแนกตามวันเริ่มป่วย ตามสัปดาห์การระบาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 26 พฤษภาคม 2568



ที่มา: 1.ฐานข้อมูลโปรแกรมโรคกำจัดกวาดล้าง ใช้ข้อมูลผู้ป่วยจำแนกตามเกณฑ์ WHO ได้แก่ Positive Measles, epidemiologically linked และ clinical compatible cases  
2. รายงาน 506 (D506)

รูปที่ 3 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยยืนยัน ผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา จำแนกตามจังหวัดที่ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2568



ที่มา: ฐานข้อมูลโปรแกรมโรคกำจัดกวาดล้าง


รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดต่อทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา และผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดต่อของจังหวัดที่พบผู้ป่วย จำแนกตามสัปดาห์ที่เริ่มป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 26 พฤษภาคม 2568

| จังหวัด         | 1  | 2  | 3 | 4  | 5  | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | รวม |
|-----------------|----|----|---|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| ปัตตานี         | 11 | 5  | 8 | 2  | 15 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 18 | 9  | 7  | 4  | 4  | 1  | 8  | 2  | 2  |    | 151 |
| ยะลา            | 9  | 5  | 9 | 13 | 9  | 7 | 7 | 6  | 9  | 4  | 7  | 6  | 6  | 4  | 2  | 4  | 3  | 1  | 1  | 1  | 113 |
| นราธิวาส        | 12 | 12 | 3 | 7  | 5  | 7 | 2 | 3  | 5  | 3  | 6  | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | 4  | 2  | 1  | 1  | 81  |
| สงขลา           | 2  | 6  | 2 | 2  | 1  | 4 | 2 |    | 2  | 4  | 2  | 6  | 2  | 3  |    | 3  | 1  | 1  |    |    | 43  |
| สระแก้ว         |    |    |   |    |    |   |   |    | 2  | 2  | 1  | 3  | 3  | 4  | 1  | 5  | 2  | 6  | 5  |    | 34  |
| ประจวบคีรีขันธ์ |    |    |   | 1  |    |   |   |    | 1  |    | 1  | 4  | 2  | 3  | 2  | 1  |    | 6  | 1  | 1  | 23  |
| กรุงเทพมหานคร   | 5  | 6  |   |    |    |   |   |    | 2  |    |    |    | 1  | 2  |    | 2  | 4  |    |    |    | 22  |
| นครปฐม          |    |    |   |    |    | 1 | 1 |    | 9  | 2  | 2  |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    | 16  |
| ระยอง           |    |    |   |    | 1  |   | 1 | 1  | 2  | 2  |    |    |    |    | 1  |    | 2  |    | 1  |    | 11  |
| ระนอง           |    |    |   |    | 10 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 10  |
| สตูล            |    | 1  | 3 |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 1  |    | 6   |
| จันทบุรี        |    |    | 1 |    |    |   |   |    |    | 1  |    |    | 2  |    |    |    |    | 1  |    | 1  | 6   |
| ชลบุรี          |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 2  | 1  | 1  |    | 5   |
| สราญราษฎร์      |    |    |   |    |    |   |   |    | 1  |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    |    | 1  | 4   |
| ฉะเชิงเทรา      |    | 1  |   | 1  | 1  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3   |
| ตราด            |    |    |   |    |    |   | 1 |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3   |
| สุรินทร์        |    |    |   |    |    |   |   |    |    | 1  | 1  |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 3   |
| ชัยภูมิ         |    |    |   |    |    | 1 |   | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2   |
| เขียงราย        |    |    |   |    |    |   | 1 |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 2   |
| นครราชสีมา      |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |    |    |    | 2   |
| อุดรธานี        |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2   |
| นนทบุรี         |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |    |    | 2   |
| กระบี่          |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 2   |
| หนองบัวลำภู     |    |    |   |    |    |   |   |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1   |
| ร้อยเอ็ด        |    |    |   |    |    |   |   |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1   |
| อุบลราชธานี     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    | 1   |
| ศรีสะเกษ        |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1   |
| เชียงใหม่       |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 1   |
| ภูเก็ต          |    | 1  |   |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1   |
| อ่างทอง         |    |    | 1 |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1   |
| มุกดาหาร        |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1   |
| ราชบุรี         |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 1   |
| ปราจีนบุรี      |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 1   |
| พระนครศรีอยุธยา |    |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1   |

หมายเหตุ: \*รายงานผู้ป่วยจากต่างประเทศเข้ารับการรักษาในประเทศไทย (imported case) ทั้ง 3 ราย

ที่มา: ฐานข้อมูลโปรแกรมโรคภัยคุกคาม

รูปที่ 5 อัตราป่วยโรคติดต่อ (ผู้ป่วยยืนยัน และผู้ป่วยเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา) จำแนกรายจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 26 พฤษภาคม 2568




ที่มา: ฐานข้อมูลโปรแกรมโรคภัยคุกคาม

| จังหวัด         | อัตราป่วยโรคติดต่อต่อแสนประชากร<br>10 อันดับแรก |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ยะลา            | 16.37                                           |
| ปัตตานี         | 11.80                                           |
| ระนอง           | 5.56                                            |
| สระแก้ว         | 4.48                                            |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 3.90                                            |
| นราธิวาส        | 3.29                                            |
| สงขลา           | 2.60                                            |
| ตราด*           | 1.38                                            |
| ระยอง           | 1.30                                            |
| สตูล            | 1.23                                            |

\*จังหวัดตราด มีรายงานผู้ป่วยจากต่างประเทศเข้ารับการรักษาในประเทศไทย (imported case) 3 ราย



รูปที่ 5 ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสายพันธุ์โรคหัด จำแนกรายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 19 พฤษภาคม 2568



## สรุปและคำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรค

สถานการณ์โรคหัด ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2568 พบแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยยืนยันนอกพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มขึ้น โดยพบผู้ป่วยกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออก และทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยังคงมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยโรคหัดข้ามมารักษายังประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันหัดสายพันธุ์จากต่างประเทศ รวมถึงมีการรายงานผู้ป่วยโรคหัดจำนวนมากในประเทศเวียดนามและกัมพูชาในปัจจุบัน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดควรมีการดำเนินการ ดังนี้

## 1. สำหรับประชาชน

- **กรณีที่ไม่มีอาการป่วย** : รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีไข้อยากผื่น และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด สำหรับเด็กควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบ 2 เข็ม โดยฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 9 เดือน และ 1 ปีครึ่ง หากเด็กยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนไม่ว่าจะอายุใด ๆ ก็ตาม ควรเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

- **กรณีที่มีอาการป่วย** : หากมีอาการไข้อยากผื่น ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการตรวจประเมิน โดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ และในช่วงที่มีอาการป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น และหากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัด ให้หยุดงาน หยุดเรียน และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น หลังจากผื่นขึ้นวันแรก ไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 วัน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

## 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

- ให้หน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นของการเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด ควรสำรวจความครอบคลุมของวัคซีนในพื้นที่ และควรเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 95 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในชุมชน

- กรณีพบผู้ป่วยไข้อยากผื่นร่วมกับผื่นชนิด Maculopapular Rash หรือสงสัยหัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนโรค พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือด ส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ภายใน 48 ชั่วโมง และเก็บตัวอย่าง Throat/nasal swab ส่งตรวจหาสายพันธุ์เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของเชื้อ รวมทั้งรายงานผู้ป่วยโรคหัด ผ่านฐานข้อมูลโปรแกรมโรคกำกวมดูล้าง(<https://appsdoe.moph.go.th/measles>) และทำการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อต่อไป

\*\*\*\*\*

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่รายงานโดยโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและงบประมาณบางส่วน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค และองค์การอนามัยโลก (WHO)

เรียบเรียงโดย : ภูมิภัทร ยอดชมภู ฉัตรมงคล สัมแบน ปรางณพิชญ์ วิหารทอง ชญานิจ มหาสิงห์ ภาวินี ด้วงเงิน  
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ  
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค