

## Screening card ฝีดาษวานร (Mpox) สำหรับสถานพยาบาล

มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด หรือ มีเพศสัมพันธ์ กับผู้มีผื่น/ตุ่มสงสัยฝีดาษวานร หรือ ผู้ป่วยฝีดาษวานร หรือ

- ( ) สัมผัสใกล้ชิด หรือ ผิวหนังสัมผัสผิวหนัง หรือ มีเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่มีผื่น/ตุ่มสงสัย หรือ ผู้ป่วยฝีดาษวานร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ อวัยวะสืบพันธุ์ ทวารหนัก หรือปาก
- ( ) พุดคุยในระยะ 1 เมตร ไอจามรดโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือ ไม่สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ปิด
- ( ) ดูแลผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยฝีดาษวานรขณะป่วย
- ( ) พักอาศัย หรือใช้ของ ใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีผื่น/ตุ่ม สงสัยฝีดาษวานร

### อาการและอาการแสดง

- ( ) ผื่น หรือ ตุ่มน้ำ หรือ ตุ่มหนองขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก หรือ บริเวณรอบๆ
- ( ) ผื่น หรือ ตุ่มน้ำ หรือ ตุ่มหนองขึ้นตามมือ เท้า หน้าอก ใบหน้า หรือบริเวณปาก
- ( ) ตรวจพบแผล ตุ่ม ในช่องปาก ( ) อวัยวะเพศบวม ( ) มี discharge จากอวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก
- ( ) ต่อม้ำเหลืองบริเวณโต บริเวณหลังหู คอ ขาหนีบ
- ( ) ไข้ ( ) เจ็บคอ คัดจมูก หรือ ไอ ( ) ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

### รูปภาพผื่น ตุ่มฝีดาษวานร

