สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ รายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ และเสียชีวิต 3 ราย

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2568 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับแจ้งจากจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-NFP) ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (NiV) จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นการรายงานผู้ป่วยยืนยันเหตุการณ์แรกในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศปี 2568 โดยผู้ป่วยทั้งสามรายไม่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา และพบในภูมิภาคที่แตกต่างกัน

รายละเอียดเหตุการณ์

ผู้ป่วยรายที่ 1 ได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 21 ปี อาศัยอยู่ในอำเภอปับนา จังหวัดราชเชห์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2568 ด้วยอาการไข้สูง รู้สึกอ่อนเพลีย อาเจียน มีความผิดปกติทางสภาพจิต ชัก และหมดสติ ต่อมาในวันที่ 26 มกราคม ผู้ป่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมชนและได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์ราชเชห์ในวันถัดไป วันที่ 28 มกราคม มีการเก็บตัวอย่างน้ำลายและเลือดของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเสียชีวิตในวันเดียวกัน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 29 มกราคม ด้วยวิธี RT-PCR และ ELISA ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โดยมีข้อมูลว่าผู้ป่วยมีประวัติบริโภคน้ำหวานจากต้นอินทผลัมดิบเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสทั้งหมด 96 ราย แบ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว 9 ราย บุคคลในชุมชน 31 ราย บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาล 56 ราย สำหรับตัวอย่างที่เก็บจากผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 56 ราย ซึ่งมีประวัติบริโภคน้ำหวานจากต้นอินทผลัมในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสนิปาห์ทั้งวิธี PCR และตรวจหาแอนติบอดี Anti-Nipah IgM ผลการทดสอบ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

ผู้ป่วยที่ 2 ได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ป่วยเพศชายอายุ 38 ปี อาศัยอยู่ในอำเภอโบลา จังหวัดบาริซาล เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน สับสน มีความผิดปกติทางสภาพจิต น้ำลายไหลมากผิดปกติ และหมดสติ ต่อมาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้ป่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์เชอร์-อี-บังกลา และได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาล ตำรวจ ในเขตราชาร์บัคห์ เมืองธากา ในวันถัดมาเนื่องจากมีอาการรุนแรงขึ้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์มีการเก็บตัวอย่างน้ำลายและเลือดของผู้ป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี RT-PCR และ ELISA ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเสียชีวิตในวันถัดไป โดยมีข้อมูลว่าผู้ป่วยมีประวัติบริโภคน้ำหวานจากต้นอินทผลัมดิบเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสทั้งหมด 71 ราย แบ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว 19 ราย บุคคลในชุมชน บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาล 45 ราย สำหรับตัวอย่างที่เก็บจากผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 48 ราย ซึ่งมีประวัติบริโภคน้ำหวานจากต้นอินทผลัมในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสนิปาห์ทั้งวิธี PCR และตรวจหาแอนติบอดี Anti-Nipah IgM ผลการทดสอบ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

ผู้ป่วยรายที่ 3 ได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ป่วยเพศชายอายุ 40 ปี อาศัยอยู่ในอำเภอฟาริดปูร์ จังหวัดธากา เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ด้วยอาการไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องเสีย ง่วงนอน หายใจลำบาก ไม่สามารถสื่อสารได้ สับสน และอยู่ในภาวะซึม ต่อมาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้ป่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์ฟาริดปูร์ และได้เก็บตัวอย่างในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR และ ELISA ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในวัดถัดไป โดยมีข้อมูลว่าผู้ป่วยมีประวัติบริโภคน้ำหวานจากต้นอินทผลัมดิบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ในอำเภอชวาดังกา จังหวัดขุลนา ซึ่งห่างจากที่พักของผู้ป่วยประมาณ 90 กิโลเมตร และอยู่ติดกับรัฐเบงกอลตะวันตกในประเทศอินเดีย จากการสอบสวนโรคพบว่า

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
อาคาร 11 ชั้น 3 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.ddc.moph.go.th/doe โทร: 0 2590 3801 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 09 2714 0829

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ รายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ และเสียชีวิต 3 ราย

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2568 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับแจ้งจากจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-NFP) ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (NiV) จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นการรายงานผู้ป่วยยืนยันเหตุการณ์แรกในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศปี 2568 โดยผู้ป่วยทั้งสามรายไม่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา และพบในภูมิภาคที่แตกต่างกัน

รายละเอียดเหตุการณ์ (ต่อ)

มีผู้สัมผัสทั้งหมด 66 ราย แบ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว 6 ราย บุคคลในชุมชน 26 ราย บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาล 34 ราย สำหรับตัวอย่างที่เก็บจากผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 36 ราย ซึ่งมีประวัติบริโภคน้ำหวานจากต้นอินทผลัมในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสนิปาห์ทั้งวิธี PCR และตรวจหาแอนติบอดี Anti-Nipah IgM ผลการทดสอบ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

องค์การอนามัยโลก ประเมินความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีอัตราการป่วยตายสูง และยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะ อาการของโรคไม่จำเพาะเจาะจง ทำให้การวินิจฉัยล่าช้าและส่งผลต่อการควบคุมการแพร่ระบาด นอกจากนี้ ค้างคาวผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งรังโรคยังคงพบในพื้นที่ และพฤติกรรมการบริโภคบางอย่างยังเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรค อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีมาตรการสาธารณสุขที่เข้มแข็ง เช่น ระบบเฝ้าระวัง การตอบสนองฉุกเฉิน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่ง องค์การอนามัยโลกได้ประเมินความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในระดับโลกอยู่ในระดับต่ำ และที่ผ่านมายังไม่ปรากฏผู้ป่วยยืนยันนอกสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย

****

ที่มา : EIS | Event Information Site for IHR National Focal Points

จัดทำ : 9 เมษายน 2568

เรียบเรียง : กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ กองระบาดวิทยา
จุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (IHR-NFP)

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
อาคาร 11 ชั้น 3 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.ddc.moph.go.th/doe โทร: 0 2590 3801 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 09 2714 0829