รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย
รายงานพบโรคไข้เลือดออกจากไวรัสเซปารา (CHHF)

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 จุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR NFP) รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย แจ้งต่อองค์การอนามัยแพนอเมริกัน/องค์การอนามัยโลก (PAHO/WHO) เกี่ยวกับการตรวจพบเชื้อไวรัสเซปารา ในคนที่ได้รับการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการจากผู้ป่วยเพศชายจากเทศบาล Palos Blancos ในกรุงลาปาซ

รายละเอียดเหตุการณ์

ผู้ป่วยเป็นเพศชาย อายุ 54 ปี อาชีพคนงานในฟาร์ม และอาศัยอยู่เทศบาล Palos Blancos ในกรุงลาปาซ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ และมีเลือดออกที่เหงือก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกที่คลินิกด้วยอาการปวดหลังส่วนล่าง ต่อมาวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผู้ป่วยมีอาการชักและหมดสติ ถูกนำตัวส่งไปที่ศูนย์สุขภาพ Palos Blancos และเสียชีวิตในวันเดียวกัน

ผู้ป่วยมีประวัติอาการทางเดินระบบหายใจที่เข้าได้กับวัณโรค ถึงแม้ว่าผลการวินิจฉัยยังไม่แน่ชัด ในขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพต่าง ๆ ได้รับการวินิจฉัยด้วยหลายอาการ รวมถึงอาการปวดหลังส่วนล่าง กระเพาะอาหารอักเสบ อาการติดเชื้อจากสารพิษ และภาวะขาดน้ำระดับกลาง การวินิจฉัยแยกโรค รวมถึงโรคไข้เลือดออกโบลิเวีย โรคเลปโตสไปโรซิส โรคไข้เลือดออก และฮันตาไวรัส ซึ่งโรคเหล่านี้อาการดังกล่าว เช่น เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด และเลือดออกตามเหงือก เป็นอาการที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง

วันที่ 30 ธันวาคม 2567 มีการเก็บตัวอย่างเลือดก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิต และในวันที่ 2 มกราคม 2568 ตัวอย่างได้ถูกส่งไปที่ศูนย์โรคเขตร้อนแห่งชาติ (CENETROP) ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสเซปารา

จากการสอบสวนโรค พบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ไม่ว่าจะเป็นอุจจาระของหนูทั้งภายในบ้านและรอบ ๆ บ้าน รวมทั้งบริเวณรอบบ้านที่มีการปลูกมะพร้าว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย เช่น การทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ดี และการทำงานเป็นเกษตรกรที่ต้องสัมผัสกับบริเวณที่อาจมีโพรงหนู บุคลากรสาธารณสุขจึงดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคเร่งด่วน ได้แก่ การฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอรีน การควบคุมหนูโดยใช้สารกำจัดหนู และการติดตามผู้สัมผัส ทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย 2 ราย (ภรรยาและลูกสาว) ซึ่งให้ผลเป็นลบ และจากการสอบสวนโรค พบว่าไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียง โดยดำเนินการควบคุมและเฝ้าระวังตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

การระบาดครั้งนี้ ถือเป็นการระบาดของโรคไข้เลือดออกจากไวรัสเซปารา (CHHF) นับเป็นครั้งที่ 5 ในรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวียและทั่วโลกนับตั้งแต่ตรวจพบไวรัสนี้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ตามการระบาดยังจำกัดอยู่ที่เขตชนบทในภาคเหนือของประเทศ และความเสี่ยงการติดต่อจากคนสู่คนยังอยู่ในระดับต่ำ

****

ที่มา : EIS | Event Information Site for IHR National Focal Points

จัดทำ : 18 มีนาคม 2568

เรียบเรียง : กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ กองระบาดวิทยา
จุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (IHR-NFP)

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
อาคาร 11 ชั้น 3 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.ddc.moph.go.th/doe โทร: 0 2590 3801 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 09 2714 0829