# ราชอาณาจักรกัมพูชา
# รายงานพบผู้เสียชีวิต โรคไข้หวัดนก
# สายพันธุ์ A (H5N1) ในคน 1 ราย

**เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-NFP) ของราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แจ้งต่อองค์การอนามัยโลก (WHO) กรณีพบผู้เสียชีวิตโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) ในคน 1 ราย จากจังหวัดเปรยแวง**

## รายละเอียดเหตุการณ์

ผู้ป่วยเป็นเพศชายอายุ 2 ปี เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ด้วยอาการไข้ ไอ และอ่อนเพลีย ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกเอกชนในพื้นที่และได้รับยา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ถูกส่งตัวไปยังกรุงพนมเปญและเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น ต่อมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 อาการทรุดลง มีภาวะหายใจลำบาก จึงถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งเป็นศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง (SARI) ผู้ป่วยถูกแยกตัว และเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก (NP) และลำคอ (OP) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมกับได้รับยาต้านไวรัส Oseltamivir ต่อมาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-qPCR โดยสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติกัมพูชา ผลพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) และผู้ป่วยเสียชีวิตในวันเดียวกัน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ผลการตรวจดังกล่าวได้รับการยืนยันอีกครั้ง โดยสถาบันปาสเตอร์ของกัมพูชา (IPC) จากการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมของยีน HA พบว่า ไวรัสที่ตรวจพบอยู่ใน clade 2.3.2.1c ซึ่งคล้ายกับสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดในสัตว์ปีกของกัมพูชามาเป็นเวลาหลายปี จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ไก่ที่เลี้ยงไว้หลังบ้านมีการป่วยและตายมากกว่า 15 ตัว นอกจากนี้ผู้ป่วยมักจะนอนและเล่นใต้ถุนบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับเล้าไก่

กรมควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (CDC) กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา (MoH) และทีมตอบสนองฉุกเฉินในพื้นที่ทำการสอบสวนโรคเพิ่มเติม และดำเนินมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ดำเนินการติดตามผู้สัมผัส พบผู้สัมผัสทั้งหมด 69 ราย รวมถึงสมาชิกในครอบครัว 9 ราย บุคลากรทางการแพทย์จากคลินิกเอกชน และชาวบ้านในชุมชน ได้เก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ที่มีอาการ 32 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ 103 ครัวเรือน และแจกจ่ายเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโรค ภาคส่วนสุขภาพสัตว์ได้ตอบสนองโดยการกำจัดและฝังซากสัตว์ปีก ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ จำกัดการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก และให้ความรู้แก่ชุมชน พร้อมทั้งสอบสวนโรคเพิ่มเติมใน 41 ครัวเรือน และกำจัดสัตว์ปีก 43 ตัวในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนั้นได้เก็บตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 4 ตัวอย่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ยังไม่มีรายงานการพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายเพิ่มเติม

ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) รายที่สองของปี พ.ศ. 2568 ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 18 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 8 ราย (อัตราการป่วยตาย ร้อยละ 44) และผู้ป่วย 13 ราย (ร้อยละ 72) เป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) ในคน ทั้งสิ้น 74 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 45 ราย (อัตราการป่วยตาย ร้อยละ 60.8)

เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) ถูกพบครั้งแรกในกัมพูชาในเดือนธันวาคม 2546 โดยเริ่มระบาดในนกป่า หลังจากนั้นจนถึงปี พ.ศ. 2557 มีการรายงานการติดเชื้อในคนเป็นระยะ ๆ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อจากสัตว์ปีกโดยตรงหรือจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2565 ไม่มีรายงานการติดเชื้อในคน อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีรายงานการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) ในคนอีกครั้ง เนื่องจากหลักฐานทางระบาดวิทยาและไวรัสวิทยาระบุว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) ยังไม่สามารถในแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ องค์การอนามัยโลกประเมินความเสี่ยงทางสาธารณสุขที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดนกอยู่ในระดับต่ำ และความเสี่ยงการแพร่ระบาดระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไวรัสยังคงแพร่กระจายในสัตว์ปีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทของกัมพูชา จึงยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อในมนุษย์เป็นระยะ ๆ

**********

ที่มา : EIS | Event Information Site for IHR National Focal Points

จัดทำ : 24 มีนาคม 2568

เรียบเรียง : กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ กองระบาดวิทยา
จุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (IHR-NFP)