

๑.๑.๒ ประเภทที่ ๒ บุคลากรตามข้อ ๑.๑.๑ ที่ไม่เคยได้วัคซีนใดๆ มา ก่อน พิจารณาให้ วัคซีน Pfizer ๒ เข็ม ห่างกัน ๓ สัปดาห์ ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาการจัดสรรวัคซีน เข็มกระตุ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าที่ได้รับการระบุรายชื่อให้เข้ารับวัคซีนจน ครบถ้วนก่อน หากมีวัคซีนเพียงพอให้พิจารณาจัดสรรกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ตกสำรวจ หรือ บุคลากรที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนเพิ่มเติม หรือบุคลากรใหม่ ทั้งนี้ ให้สถานพยาบาลรับผิดชอบในการ ให้วัคซีนแก่บุคลากรในสังกัดที่ยังปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่จัดส่งรายชื่อมาขอรับการสนับสนุนวัคซีน โดยขอให้ หัวหน้าสถานพยาบาลตรวจสอบรายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนวัคซีนและผู้ที่เข้ารับวัคซีน ให้เป็นบุคคลเดียวกัน และเปิดเผยจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อความโปร่งใส

๑.๒ กลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทยในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

๑.๒.๑. เครื่องครัดการฉีดวัคซีนให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้มีภาวะเสี่ยงสูง ต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด ๑๙ ที่มีสัญชาติไทย ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (๓ จังหวัด ตามข้อกำหนดดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๔) ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ดังนี้

๑.๒.๑.๑ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

๑.๒.๑.๒ ผู้มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ได้แก่

(๑) โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบ

หืด ที่ควบคุมได้ไม่ดี

(๒) โรคหัวใจและหลอดเลือด

(๓) โรคไตเรื้อรังระยะ ๕

(๔) โรคหลอดเลือดสมอง

(๕) โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด

(๖) โรคเบาหวาน

(๗) โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย

มากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร

๑.๒.๑.๓ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป

๑.๒.๑.๔ กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในเด็กที่จะทำให้โรคโควิด ๑๙ รุนแรง ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลที่มีโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่อ ตารางเมตรหรือมีน้ำหนัก ๗๐ กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ ๑๒ - ๑๓ ปี ที่มีน้ำหนัก ๘๐ กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ ๑๓ - ๑๕ ปี ที่มีน้ำหนัก ๙๐ กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ ๑๕ - ๑๘ ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น)

(๒) โรค...

- (๒) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้ง หอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
- (๓) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
- (๔) โรคไตรายเรื้อรัง
- (๕) โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
- (๖) โรคเบาหวาน
- (๗) กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาท อย่างรุนแรงเด็กที่มีพัฒนาการช้า

๑.๓ ชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

๑.๓.๑ ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ ๑๗ สัปดาห์ขึ้นไป และชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศที่มีหลักฐานแสดงความจำเป็นว่าต้องรับวัคซีน Pfizer ก่อนถึงประเทศไทย เช่น นักเรียน/นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ ดังนี้

๑.๓.๑.๑ กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการต่างประเทศ (www.expatvac.consular.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และรับบริการตามจุดบริการที่กำหนด โดยกระทรวงการต่างประเทศประสานการดำเนินงานร่วมกับกรมควบคุมโรค

๑.๓.๑.๒ กรณีอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และเข้ารับบริการตามจุดบริการที่จังหวัดกำหนด หรือสามารถลงทะเบียนตามข้อ ๑.๓.๑.๑ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

๑.๓.๒ ชาวไทยต้องเดินทางไปต่างประเทศ ให้แสดงหลักฐานความจำเป็นว่าต้องรับวัคซีน Pfizer ตามที่ประเทศปลายทาง เช่น สถานศึกษา/สถานประกอบการกำหนด หรือ มีประวัติแพ้วัคซีนชนิดอื่นอย่างรุนแรง ณ โรงพยาบาลที่ให้บริการวัคซีน Pfizer เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าสถานพยาบาลที่ให้วัคซีนต่อไป

๑.๓.๓ สำหรับนักเรียนสัญชาติไทยที่ต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศภายในปี ๒๕๖๔

๑.๓.๓.๑ กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนกับศูนย์ฉีดวัคซีน และสุขภาพบางรักเพื่อนัดหมายเข้ารับวัคซีน

๑.๓.๓.๒ กรณีอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมโรคเพื่อนัดหมายเข้ารับวัคซีน ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานความจำเป็นว่าต้องรับวัคซีน Pfizer ตามที่ประเทศปลายทางกำหนด ให้หัวหน้าสถานพยาบาลสามารถพิจารณาให้วัคซีนชนิดอื่น เช่น AstraZeneca หรือ Sinovac ได้ตามความเหมาะสม

๒. ติดตามกำกับให้มีการรายงานผลให้บริการวัคซีนรายบุคคลให้ครบถ้วน และบันทึกจำนวนวัคซีนคงคลังประจำวัน ผ่านระบบติดตามการให้วัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข <https://cvp1.moph.go.th/> โดยขอให้สถานพยาบาลตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนขอให้แก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

๓. หากพบการฉีดวัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด้านหน้า กลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทยในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีประเด็นข้อร้องเรียน ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน หรือโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและรายงานไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อร่วบรวมข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสาน การ์ยกิวนพวงศ์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
กรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๖๙ - ๕๙ ต่อ ๑๓๒
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๙ - ๙ ต่อ ๑๐๒

สำเนาส่ง กรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด