


# การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช

ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข





# แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในระบะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

## เป้าประสงค์ของแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19

### ในระบะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง



✓ ประชากรทุกคนบนแผ่นดินไทย  
ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถเข้าถึง  
วัคซีนด้วยความสะดวกและสมัครใจ  
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย



✓ เน้นให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง รับวัคซีน  
เข็มกระตุ้น เพื่อลดความรุนแรง  
และการเสียชีวิต



✓ กรณีมีวัคซีนโควิด-19 รุ่นใหม่  
สามารถจัดหาวัคซีนได้เพียงพอ  
โดยเฉพาะสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง





# แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในระบะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

- ปัจจุบันมีวัคซีนโควิด-19 เพียงพอสำหรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ 6 เดือน ขึ้นไป
- เน้นฉีดเข็มกระตุ้นในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และโรคเรื้อรัง
- ขณะนี้ยังไม่มีคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ แต่เบื้องต้นวางแผนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นปีละ 1-2 ครั้งแบบวัคซีนไข้วัดใหญ่

(รอคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค) รวมทั้งข้อมูลวัคซีนรุ่นใหม่และระยะเวลาที่ป้องกันโรคได้

- มีการเตรียมวางแผนทางงบประมาณสำหรับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 รุ่นใหม่





# แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เนื่องจากพรก.ฉุกเฉินสิ้นสุดลง ทำให้กระบวนการกระจายและจัดส่งวัคซีนจะดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างปกติ ทำให้ต้องมีแผนการดำเนินงานล่วงหน้าและชัดเจนในแต่ละเดือน

1. การสำรวจความต้องการและการจัดส่งวัคซีน (รอบปกติ) จะดำเนินการ **1 ครั้ง/เดือน**
2. สำรวจความต้องการวัคซีน (รอบปกติ) **ทุกวันที่ 20 ของเดือน** หากตรงกับวันหยุดราชการจะเป็นวันราชการก่อนหน้า
3. ดำเนินการ**ผ่านกลไกกองตรวจราชการ** (ผช. ผตร. ประสานงาน ลงข้อมูลผ่าน google sheet)
4. **ขอให้สำรองวัคซีน**ในจังหวัดให้เพียงพอสำหรับการให้บริการ
  - กรณีไม่มีข้อจำกัดด้านการจัดเก็บหรืออายุวัคซีน ประมาณ 2 เดือน (รวมถึงวัคซีน Pfizer ฝาม่วง หากมีตู้เย็น -70 องศาเซลเซียส)
  - หากมีข้อจำกัด ให้พิจารณาสำรองตามศักยภาพตู้เย็นตามชนิดวัคซีน หรือตามอายุของวัคซีน



**การเบิกจ่ายวัคซีนนอกรอบปกติ (กรณีเร่งด่วนหรือสำหรับองค์กรในพื้นที่)** ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำหนังสือ

- เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค
- ระบุชนิด/จำนวนวัคซีน/ผู้ประสานงาน/วันและเวลา ที่สะดวกมารับวัคซีน ณ คลังวัคซีน กรมควบคุมโรค
- ประสานกลุ่มเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เบอร์โทร 02-590-3222



# แผนการบริหารจัดการวัคซีน Pfizer ฝาสีแดง สำหรับเด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี

- ได้มีนโยบายให้สำรองสำหรับเป็นเข็มที่ 2 เนื่องจาก
  - เข็มที่ 1 และ 2 มีระยะห่างกันระยะห่าง **4 สัปดาห์** (3-8 สัปดาห์)
  - วัคซีนสามารถจัดเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้นาน **10 สัปดาห์**
- คาดว่าจะจัดส่งวัคซีนถึงพื้นที่ได้ประมาณ **สัปดาห์ที่ 2** ของเดือนตุลาคม 2565
- วัคซีนจะทยอยเข้ามา ขอให้ทุกจังหวัดบริหารจัดการฉีด **ก่อนที่วัคซีนจะหมดอายุ** (วัคซีน 5 แคนโดสแรกที่จะทยอยรับมอบ จะหมดอายุวันที่ 30 เมษายน 2566)



## แต่ละจังหวัดสามารถบริหารจัดการฉีด

- ✓ ผ่าน **สถานพยาบาล** ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- ✓ ฉีดให้กับ **ศูนย์เด็กเล็ก** โดย สสจ. ประสานงานกับ อปท. เพื่อบริการฉีดให้กับเด็กเล็กภายใต้การกำกับของแพทย์
- ✓ จัดบริการฉีดที่ **คลินิกเด็กดี** หรือ **ในรพ.สต.** เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กที่มารับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้สามารถรับพร้อมกันได้



สรุปผลการขอสนับสนุนวัคซีน **Pfizer ฟ้าสีแดง** สำหรับเด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี  
จาก สสจ. ทุกจังหวัด และสำนักอนามัย กทม.

เขตสุขภาพ	จำนวนที่ขอรับการสนับสนุน (โดส)
1	56,880
2	8,160
3	6,070
4	11,790
5	17,860
6	38,730
7	2,000

เขตสุขภาพ	จำนวนที่ขอรับการสนับสนุน (โดส)
8	9,430
9	50,966
10	2,520
11	9,690
12	3,700
13	100,000
<b>รวม</b>	<b>317,796</b>

# การขนส่งวัคซีน Pfizer ฝาสีแดง



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control


-60 ถึง -90C



คลังซิลลิคฟาร์มา




-60 ถึง -90C



76 จังหวัด

สสจ./รพศ./รพท.






กทม

รพ.เอกชน

รพ.ภาครัฐสังกัดอื่นๆ  
และ รพ.มหาวิทยาลัย



2-8 หรือ -60 ถึง -90 C ขึ้นกับ  
ชนิดตู้เย็น



ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565



# แผนการบริหารจัดการวัคซีน Pfizer ฝาสีแดง สำหรับเด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี

- ขอให้บริหารจัดการวัคซีน Pfizer ฝาสีแดง อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่วัคซีนหมดอายุ
- ขอให้หน่วยบริการที่ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีแดง บันทึกข้อมูลในสมุดสุขภาพแม่และเด็ก และในระบบ MOPH IC โดยกำหนดรหัสการบันทึกข้อมูล ดังนี้



รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน กยผ.)	ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีน ภาษาไทย	ประเภท	อายุ (เดือน)/ กลุ่มเป้าหมาย	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD-10-TM
CP1	Covid-19 (Pfizer)	โควิด 19 (บริษัทไฟเซอร์)	ฉีด	สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 1	โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	U11.9
CP2	Covid-19 (Pfizer)	โควิด 19 (บริษัทไฟเซอร์)		สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 2		
CP3	Covid-19 (Pfizer)	โควิด 19 (บริษัทไฟเซอร์)		สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 3		





# คำแนะนำในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน กรณีการได้รับวัคซีนโควิด 19

## เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีน Pfizer ฝาสีแดง ที่พบได้

- พบบ่อย อาการปวดหรือบวมแดงบริเวณที่ฉีด
- อาการแพ้ (hypersensitivity) เช่น มีผื่นนูนแดง ปาก หน้าตา หรือหน้าบวม
- อาการแพ้รุนแรง (anaphylaxis) ซึ่งพบน้อย เช่น หายใจลำบาก เหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด คลื่นไส้ อาเจียน ความดันโลหิตต่ำ



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนอาจเกิดขึ้นได้ หลังฉีดวัคซีนขอให้พักผ่อนอาการอย่างน้อย 30 นาที และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน (AEFI) ตามแนวทางของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เพื่อเป็นการกำกับติดตามความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ ต่อวัคซีนและงานบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค



ขอบคุณครับ