

เอกสารกำกับยา (วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่)

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

1. แบบ Single dose (Influvac)
2. แบบ Single dose (GC Flu)
3. แบบ Multiple dose (GPO-MBP)

1. แบบ Single dose (Influvac)

Abbott - Established Pharmaceuticals Division

Version Number: 2.0

Effective date: 15-MAR-2017

QMR122373/2 SOLID 0001299978

Approved date:

EPLD.14.02.F03

Mascherina

Packaging & Label Management

INVOLVED PLANT: Olst Influvac

PRODUCT NAME: Influvac 0.5 ml Suspension for injection

AFFILIATE ORIGINATOR: Myanmar; Thailand Influvac

ORIGINATING FROM LCR / MKPR Number: LCR-15784-2020-DEV

COMMODITY CODE: 1127298

COMMODITY TYPE: Leaflet

CUTTING GUIDES / SIZE: LCS 120 43045 120x575mm fold to 120x23mm

PHARMACODE: 56 (X X I I X)

COLORS: PROCESS BLACK

FONT STYLE / MINIMUM FONT SIZE FOR TEXT: English text: Helvetica Neue / 6.5 pt
Thai text: UPC-Angsana / 7.8 pt

NOTES: LTS 1-0-7

☒ 1st draft
Date 26/11/2020
Operator/Dev. M. Blaz

☐ 2nd draft
Date
Operator/Dev.

☐ 3rd draft
Date
Operator/Dev.

☐ 4th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 5th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 6th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 7th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 8th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 9th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 10th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 11th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 12th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 13th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 14th draft
Date
Operator/Dev.

☐ 15th draft
Date
Operator/Dev.

 Abbott



1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

INFLUVAC®, suspension for injection (influenza vaccine, surface antigen, inactivated).

2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

Influenza virus surface antigens (inactivated) (haemagglutinin and neuraminidase) of the following strains*:

- A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like strain 15 micrograms HA **
- A/Victoria/2570/2019, IVR-215)
- A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like strain 15 micrograms HA **
- A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208)
- B/Washington/02/2019 -like strain 15 micrograms HA **
- (B/Washington/02/2019, wild type)

* propagated in fertilised hens' eggs from healthy chicken flocks

** haemagglutinin

This vaccine complies with the World Health Organisation (WHO) recommendation (southern hemisphere) and competent authority decision for the 2021 season.

For a full list of excipients see section 6.1.

INFLUVAC® may contain traces of eggs (such as ovalbumin, chicken proteins), formaldehyde, cetyltrimethylammonium bromide, polysorbate 80 or gentamicin, which are used during the manufacturing process (see section 4.3)

3. PHARMACEUTICAL FORM

Suspension for injection in prefilled syringe; a colourless clear liquid, filled in single-dose syringes

4. CLINICAL PARTICULARS

4.1 Therapeutic indications

Prophylaxis of influenza; especially those who run an increased risk of associated complications.

INFLUVAC® is indicated in adults and children from 6 months of age.

The use of INFLUVAC® should be based on official recommendations.

Vaccination is particularly recommended for the following categories of patients, depending on national immunization policies:

- Persons aged ≥ 65 years, regardless their health condition.
- Adults and children with chronic disorders of the pulmonary or cardiovascular systems, including asthma.
- Adults and children with chronic metabolic diseases such as diabetes mellitus.
- Adults and children with chronic renal dysfunction.
- Adults and children with immunodeficiencies due to disease or immunosuppressant medication (e.g., cytostatics or corticosteroids) or radiotherapy.
- Children and teenagers (6 months - 18 years) who receive long-term acetylsalicylic acid containing medication, and might therefore be at risk for developing Reye's syndrome following an influenza infection.

4.2 Posology and method of administration

Posology

Adults: 0.5 ml.

Paediatric Population:

Children from 36 months onwards: 0.5 ml.

Children from 6 months to 35 months: Clinical data are limited. Dosages of 0.25 ml or 0.5 ml may be given, for detailed instructions on administering a 0.25 ml or 0.5 ml dose, see section 6.6. The dose given should be in accordance with existing national recommendations.

For children who have not previously been vaccinated, a second dose should be given after an interval of at least 4 weeks.

Children less than 6 months: the safety and efficacy of INFLUVAC® in children less than 6 months have not been established. No data are available.

Method of Administration

Immunisation should be carried out by intramuscular or deep subcutaneous injection.

Precautions to be taken before handling or administering the medicinal product:

For instructions for preparation of the medicinal product before administration, see section 6.6.

4.3 Contraindications

Hypersensitivity to the active substances, to any of the excipients listed in section 6.1 or to any component that may be present as traces such as eggs (ovalbumin, chicken proteins), formaldehyde, cetyltrimethylammonium bromide, polysorbate 80 or gentamicin.

Immunisation shall be postponed in patients/children with febrile illness or acute infection.

4.4 Special warnings and special precautions for use

As with all injectable vaccines, appropriate medical treatment and supervision should always be readily available in case of an anaphylactic event following the administration of the vaccine.

INFLUVAC® should under no circumstances be administered intravascularly.

As with other vaccines administered intramuscularly, INFLUVAC® should be given with caution to individuals with thrombocytopenia or any coagulation disorder since bleeding may occur following an intramuscular administration to these subjects.

Anxiety-related reactions, including vasovagal reactions (syncope), hyperventilation or stress-related reactions can occur following, or even before, any vaccination as a psychogenic response to the needle injection. This can be accompanied by several neurological signs such as transient visual disturbance, paraesthesia and tonic-clonic limb movements during recovery. It is important that procedures are in place to avoid injury from faints.

INFLUVAC® is not effective against all possible strains of influenza virus.

INFLUVAC® is intended to provide protection against those strains of virus from which the vaccine is prepared and to closely related strains.

As with any vaccine, a protective immune response may not be elicited in all vaccinees.

Antibody response in patients with endogenous or iatrogenic immunosuppression may be insufficient.

Interference with serological testing: see section 4.5.

This medicine contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i.e. essentially 'sodium-free'.

This medicine contains potassium, less than 1 mmol (39 mg) per dose, i.e. essentially "potassium-free".

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

INFLUVAC® may be given at the same time as other vaccines. Immunisation should be carried out on separate limbs. It should be noted that the adverse reactions may be intensified.

The immunological response may be diminished if the patient is undergoing immunosuppressant treatment. Following influenza vaccination, false positive results in serology tests using the ELISA method to detect antibodies against HIV1, Hepatitis C and especially HTLV1 have been observed. The Western Blot technique disproves the false-positive ELISA test results. The transient false-positive reactions could be due to the IgM response by the vaccine.

4.6 Fertility, pregnancy and lactation

Pregnancy

Inactivated influenza vaccines can be used in all stages of pregnancy. Larger datasets on safety are available for the second and third trimester, compared with the first trimester; however, data from worldwide use of influenza vaccine do not indicate any adverse foetal and maternal outcomes attributable to the vaccine.

Breastfeeding

INFLUVAC® may be used during breastfeeding.

Fertility

No fertility data are available.

4.7 Effects on ability to drive and use machines

INFLUVAC® has no or negligible influence on the ability to drive and use machines.

4.8 Undesirable effects

a. Summary of the safety profile

The most frequently reported adverse drug reactions following use of INFLUVAC® are local and/or systemic reactions such as injection site pain or fatigue and headache. Most of these adverse reactions are of mild to moderate intensity.

These reactions usually disappear within 1-2 days without treatment.

In rare cases, allergic reactions may evolve to shock, angioedema (see section 4.4)

b. Tabulated summary of adverse reactions

The following undesirable effects have been observed during clinical trials or are resulting from post-marketing experience with the following frequencies:

very common (≥1/10); common (≥1/100, <1/10); uncommon (≥1/1,000, <1/100); and not known (adverse reactions from post-marketing experience; cannot be estimated from the available data).

Adverse Reactions Reported with INFLUVAC®				
MedDRA System Organ class	Very common ≥1/10	Common ≥1/100 <1/10	Uncommon ≥1/1000, <1/100	Not Known ^a (cannot be estimated from the available data)
Blood and lymphatic system				Transient thrombocytopenia, transient lymphadenopathy
Immune system disorders				Allergic reactions, in rare cases leading to shock angioedema
Nervous system disorders		Headache ^b		Neuralgia, paraesthesia, febrile convulsions, neurological disorders, such as encephalomyelitis, neuritis and Guillain Barré syndrome.
Vascular disorders				Vasculitis associated in very rare cases with transient renal involvement
Skin and subcutaneous tissue disorders		Sweating ^b		Generalised skin reactions including pruritus, urticaria or non-specific rash
Musculoskeletal and connective tissue disorders		Myalgia arthralgia ^b		
General disorders and administration site conditions		Fever, malaise, shivering, fatigue Local reactions: redness, swelling, pain, ecchymosis, induration ^b		
^a Because these reactions are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not possible to reliably estimate their frequency or establish a causal relationship to drug exposure.				
^b These reactions usually disappear within 1-2 days without treatment.				

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product.

Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system.

4.9 Overdose

Overdosage is unlikely to have any untoward effect.

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1 Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Influenza vaccine, ATC Code: J07BB02.

Seroprotection is generally obtained within 2 to 3 weeks. The duration of postvaccinal immunity to homologous strains or to strains closely related to the vaccine strains varies but is usually 6-12 months.

5.2 Pharmacokinetic properties

Not applicable.

5.3 Preclinical safety data

Not applicable.

6. PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1 List of excipients

Potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate and water for injections.

6.2 Incompatibilities

In the absence of compatibility studies, this medicinal product must not be mixed with other medicinal products.

6.3 Shelf life

1 year

6.4 Special precautions for storage

Store at 2°C to 8°C (in a refrigerator).

Do not freeze.

Store in the original package in order to protect from light.

6.5 Nature and contents of container

0.5 ml suspension for injection in prefilled syringe (glass, type I), pack of 1 or 10.

6.6 Special precautions for disposal and other handling

The vaccine should be allowed to reach room temperature before use.

Shake before use. Inspect visually prior to administration.

For the administration of a 0.25 ml dose from a single dose 0.5 ml syringe, push the front side of the plunger exactly to the edge of the mark so that half of the volume is eliminated; a volume of 0.25 ml of the vaccine remains in the syringe, suitable for administration. See also section 4.2.

Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

7. MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

Importer:

Abbott Laboratories Ltd., Bangkok, Thailand

Manufacturer:

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12

NL-8121 AA Olst

The Netherlands

8. DATE OF APPROVAL/REVISION OF THIS TEXT

December 2020

(RDCCDS000650/2)

เอกสารกำกับยาภาษาไทย

INFLUVAC® 2021

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2021

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ยา

INFLUVAC® สารละลายแขวนตะกอนสำหรับฉีด

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ชนิด surface antigen, inactivated)

2. ปริมาณและคุณสมบัติของตัวยาสำคัญ

ส่วนเลือกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (ชนิดเชื้อตาย) (haemagglutinin and neuraminidase) ของสายพันธุ์ ดังต่อไปนี้

- A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like strain (A/Victoria/2570/2019, IVR-215) 15 ไมโครกรัมของซีเมกกลูตินิน
- A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like strain (A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208) 15 ไมโครกรัมของซีเมกกลูตินิน
- B/Washington/02/2019 -like strain (B/Washington/02/2019, wild type) 15 ไมโครกรัมของซีเมกกลูตินิน

ต่อขนาดยา 0.5 มิลลิลิตร

* เพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสในไข่จากแม่ไก่สุขภาพสมบูรณ์

ส่วนประกอบของวัคซีนนี้จะปรับเปลี่ยนทุกปีตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งโลกได้ วัคซีนขนาด 0.5 มิลลิลิตร สำหรับฤดูกาลระบาดปี 2021 ประกอบด้วยสารประกอบ เป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

สำหรับรายการสารอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบในวัคซีน ดูหัวข้อ 6.1

INFLUVAC® อาจมีส่วนประกอบของสารที่ถูกใช้การผลิตวัคซีนปามา ได้แก่ องค์ประกอบในไข่ไก่ (เช่น ovalbumin, โปรตีนไข่ไก่), formaldehyde, cetyltrimethylammonium bromide, polysorbate 80, gentamicin เป็นต้น ซึ่งถูกใช้ในกระบวนการผลิต (ดูหัวข้อ 4.3)

3. ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม

สารละลายแขวนตะกอนสำหรับฉีด บรรจุใน prefilled syringes เป็นของเหลวใส ไม่มีสี บรรจุในกระบอกฉีดแบบใช้ครั้งเดียว

4. คุณสมบัติทางคลินิก

4.1 ข้อบ่งชี้ทางการรักษา

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคคลที่ต้องงดการลดโอกาสการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มีโรคแทรกซ้อน INFLUVAC® ใช้สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน

แนะนำให้ฉีดในฤดูใบไม้ร่วงในฤดูที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้

- การพิจารณาให้วัคซีนในบุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แม้ไม่มีภาวะทางสุขภาพ
- ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางเดินหายใจและปอด เช่น โรคหอบหืด
- ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่หัวใจ ไม่ว่าจะเป็นโรคทางสรีรวิทยา
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
- ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ staphylococcal แบบเฉียบพลัน
- ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ติดเชื้อ HIV, ภาวะความผิดปกติของระบบเลือด ผู้ป่วยที่ได้รับ immunosuppressant drugs, cytostatic drugs, รังสีรักษา หรือ corticosteroids ในขนาดที่สูง
- เด็กและวัยรุ่น (อายุ 6 เดือน - 18 ปี) ที่ได้รับการรักษาด้วยยาแอสไพรินเป็นเวลานานและอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิด Reye's syndrome หากมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

4.2 ขนาดยาและวิธีการใช้ยา

ขนาดยา

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 36 เดือน คือ 0.5 มิลลิลิตร

ขนาดยาสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 - 35 เดือน คือ 0.25 มิลลิลิตร หรือ 0.5 มิลลิลิตร โปรดอ่านคำแนะนำการบริหารยาขนาด 0.25 มิลลิลิตร หรือ 0.5 มิลลิลิตร

โดยละเอียด ในหัวข้อ 6.6 ขนาดยาที่ฉีดควรเป็นไปตามคำแนะนำในการฉีดวัคซีนในประเภท

สำหรับเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน แนะนำให้ฉีดอีก 1 เข็ม หลังจากเข็มแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์

เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน: ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลสำหรับการใช้วัคซีน INFLUVAC® ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน

วิธีการใช้ยา

ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ หรือใต้ผิวหนังลึก

ควรใช้ความระมัดระวังในการฉีดหรือการบริหารยา

สำหรับคำแนะนำในการเตรียมยาฉีดก่อนการใช้ ดูหัวข้อ 6.6

4.3 ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้วัคซีนเป็นผู้ที่แพ้ส่วนประกอบใด ๆ ในวัคซีนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 6.1 หรือผู้ที่แพ้ไข่ (เช่น ovalbumin, โปรตีนไข่ไก่), formaldehyde, cetyltrimethylammonium bromide, polysorbate 80, gentamicin

เมื่อมีอาการแพ้ หรือติดเชื้ออย่างเฉียบพลัน ควรเลื่อนการให้วัคซีนออกไป

4.4 ข้อควรระวังและข้อควรระวังในการใช้ยา

อาจเกิดอาการแพ้หลังจากได้รับยาเช่นเดียวกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ ควรสังเกตอาการและเตรียมการรักษาให้พร้อมเสมอสำหรับกรณีที่เกิดอาการแพ้

แพ้ยาเฉียบพลันแบบ anaphylactic หลังฉีดวัคซีน

ห้ามฉีด INFLUVAC® เข้าทางหลอดเลือด

ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ รวมถึง INFLUVAC® อาจทำให้เลือดออกได้ ควรเฝ้าระวังการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับอาการชักเกร็ง เช่น อาการหมดสติชั่วขณะ อาการหายใจหอบ (hyperventilation) หรือ ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับอาการเกร็ง ซึ่งเป็นการตอบสนองทางจิตใจ สามารถเกิดขึ้นได้หลังหรือก่อนการฉีดวัคซีน ปฏิกิริยาที่สามารถเกิดร่วมไปกับการทางระบบประสาทหลายอาการ เช่น

การมองเห็นผิดปกติชั่วคราว และ อาการเกร็งกระตุกของแขนขา (tonic-clonic limb movements) การหาวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเป็นลมหมดสติจึงเป็นสิ่งสำคัญ

INFLUVAC® ไม่ได้มีประสิทธิผลต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

INFLUVAC® ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่เป็นส่วนประกอบในยาและสายพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงเท่านั้น

เช่นเดียวกับวัคซีนอื่น การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคอาจไม่ถูกกระตุ้นออกมาเหมือนกับในทุกคน

ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน อาจทำให้ระดับของแอนติบอดีไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

การใช้วัคซีนจะเป็นการประเมินผลการตรวจทางน้ำเหลือง ดูหัวข้อ 4.5

ยานี้ประกอบด้วยไซโตซีนน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มิลลิกรัม) ต่อขนาดยา จึงจัดเป็นยา “ปราศจากไซโตซีน”

ยานี้ประกอบด้วยโพแทสเซียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (39 มิลลิกรัม) ต่อขนาดยา จึงจัดเป็นยา “ปราศจากโพแทสเซียม”

4.5 อันตรกิริยากับยาอื่น ๆ หรืออันตรกิริยาอื่น ๆ

อาจให้ INFLUVAC® พร้อมวัคซีนอื่นได้ในเวลาเดียวกัน แนะนำให้ฉีดคนละข้าง

ควรระวังด้วยว่าอาการข้างเคียงอาจเพิ่มขึ้นได้

การตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน อาจลดลงหากคนไข้กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาด้วยสารกดภูมิคุ้มกัน

การใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อาจทำให้เกิดผลบวกในการตรวจทางน้ำเหลือง เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ HIV1, Hepatitis C และ HTLV1

โดยวิธี ELISA เทคนิค Western Blot สามารถพิสูจน์ว่าผลจากการทดสอบโดยวิธี ELISA เป็นผลบวก

ผลบวกอาจชั่วคราว อาจเกิดจากการตอบสนองของอิมมูโนโกลบูลินเอ็มเมื่อได้รับการฉีดวัคซีน

4.6 การใช้ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรและผลการสืบพันธุ์

สตรีมีครรภ์

INFLUVAC® สามารถใช้ได้โดยคน โดยไม่มีอันตรายต่อทารกในครรภ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสที่สองและสาม มากกว่าช่วงไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการใช้วัคซีน

ไข้หวัดใหญ่จากทั่วโลกไม่บ่งชี้ถึงอาการไม่พึงประสงค์ต่อการหรือผลต่อการตั้งครรภ์อื่นเนื่องมาจากวัคซีน

สตรีให้นมบุตร

INFLUVAC® สามารถใช้ได้ในช่วงให้นมบุตร

ผลการสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

4.7 ผลต่อความสามารถในการขับถ่ายและการใช้เครื่องจักรกล

INFLUVAC® ไม่มีผลต่อความสามารถในการขับถ่ายและการใช้เครื่องจักรกล

4.8 อาการไม่พึงประสงค์

a. สรุปข้อมูลความปลอดภัย

อาการไม่พึงประสงค์ส่วนมากจากการใช้ยา INFLUVAC® ทั้งอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะที่และ/หรืออาการที่เกิดจากปฏิกิริยาทั่วร่างกาย ได้แก่ อาการปวด

บริเวณที่ฉีดยา หรืออ่อนล้า และอาการปวดศีรษะ โดยส่วนมากเป็นอาการที่ไม่รุนแรง

อาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้หายได้เองใน 1-2 วัน โดยไม่ต้องรักษา

อาการแพ้ที่ทำให้เกิดอาการช็อก angioedema พบน้อยมาก (ดูหัวข้อ 4.4)

b. ตารางสรุปอาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงค์ต่อไปนี้ได้รับการรายงานจากการทดลองทางคลินิก หรือรายงานที่รับหลังผลิตขึ้นออกสู่ตลาด

โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้: พบบ่อยมาก (≥1/10) พบบ่อย (≥1/100 ถึง <1/10) พบน้อย (≥1/1,000 ถึง <1/100) และ ไม่ทราบ (อาการไม่พึงประสงค์ที่ได้รับการ

รายงานหลังผลิตขึ้นออกสู่ตลาด ไม่สามารถประเมินความถี่ได้จากข้อมูลที่มี)

อาการไม่พึงประสงค์ที่ได้รับการรายงานจากการใช้ยา INFLUVAC®				
MedDRA System Organ class	พบบ่อยมาก ≥ 1/10	พบบ่อย ≥1/100 ถึง <1/10	พบน้อย ≥1/1,000 ถึง <1/100	ไม่ทราบ* (ไม่สามารถประเมินความถี่ได้จากข้อมูลที่มี)
ระบบเลือดและน้ำเหลือง				ปริมาณเกล็ดเลือดต่ำชั่วคราว (transient thrombocytopenia) ภาวะต่อมน้ำเหลืองโตชั่วคราว (transient lymphadenopathy)
ความคิดผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน				อาการแพ้ที่ทำให้เกิดอาการช็อก angioedema ซึ่งพบได้น้อยมาก
ความคิดผิดปกติของระบบประสาท		ปวดศีรษะ ^b		อาการปวดตามเส้นประสาท (neuralgia) การรับรู้ความรู้สึกสัมผัสผิดปกติ (paresthesia) อาการชัก ความคิดผิดปกติของระบบประสาท เช่น encephalomyelitis, neuritis และ Guillain - Barré syndrome
ความคิดผิดปกติของหลอดเลือด				การอักเสบของหลอดเลือดที่ทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือด ซึ่งพบได้น้อยมาก
ความคิดผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง		เหงื่อออก ^b		อาการทางผิวหนังทั่วร่างกาย รวมทั้งอาการคัน ผื่นพิษ หรือคัน
ความคิดผิดปกติของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน		ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ^b		
ความคิดผิดปกติทั่วไปและอาการบริเวณที่ฉีดยา		มีไข้ รู้สึกไม่สบายตัว ล้า ปวดศีรษะ เหงื่อออก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อาการเฉพาะที่: แดง บวม ปวด ห้อเลือด ผื่นผื่น ^b		
* เนื่องจากอาการเหล่านี้ได้รับรายงานโดยสมัครใจจากกลุ่มประชากรที่มีขนาดไม่แน่นอน จึงเป็นไปได้ที่จะประเมินความถี่หรือระดับความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้ยา				
^b อาการเหล่านี้มักหายได้เองภายใน 1-2 วัน โดยไม่ต้องรักษา				

การรายงานอาการไม่พึงประสงค์

การรายงานอาการไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับอนุญาตผลิตขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้สามารถติดตามประเมินประโยชน์ต่อความเสี่ยงของยาได้

อย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพควรรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่สงสัยผ่านทางระบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของประเทศ

4.9 การได้รับยาเกินขนาด

การได้รับยาเกินขนาด ไม่น่าจะเกิดผลร้ายแรงใด ๆ

5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์

กลุ่มทางเภสัชบำบัด: Influenza vaccine, ATC Code: J07BB02

ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังจากได้รับยา

ระยะเวลาในการป้องกัน โดยทั่วไปจะอยู่ในระหว่าง 6-12 เดือน

5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลศาสตร์

ยังไม่มีผลการศึกษา

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก

ยังไม่มีผลการศึกษา

6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม

6.1 รายการตัวยาไม่สำคัญ

Potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, and water for injections

6.2 ความไม่เข้ากันของยา

เนื่องจากไม่มีการศึกษาความเข้ากันด้วยยา จึงไม่ควรมีส่วนผสมกับยาอื่น ๆ

6.3 อายุของยา

1 ปี

6.4 ข้อควรระวังในการเก็บรักษา

INFLUVAC® ควรเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2-8° ซ. (ในตู้เย็น)

ห้ามแช่แข็ง

ควรเก็บวัคซีนในภาชนะบรรจุเดิม เพื่อป้องกันแสง

6.5 ลักษณะและส่วนประกอบของภาชนะบรรจุ

หลอดแก้วพร้อมฉีดยา (glass, type I) ขนาด 0.5 มิลลิลิตร บรรจุกล่องละ 1 หรือ 10 หลอด

6.6 ข้อควรระวังพิเศษในการจัดซื้อและคำแนะนำในการใช้ยา

ควรวาง INFLUVAC® ดังไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนใช้ เขย่าก่อนใช้ ควรตรวจสอบลักษณะของวัคซีนด้วยตาก่อนการฉีด ค้นเพิ่มเติมเพื่อได้อาการและตั้งในแนวตั้ง โดยการกลั่นอย่างช้า ๆ

สำหรับการฉีดในขนาดยา 0.25 มิลลิลิตรจากวัคซีนขนาด 0.5 ml ให้ดันกระบอกสุบยาไปด้านหลังจนถึงตำแหน่งบอกปริมาณ เพื่อปริมาณยาครึ่งหนึ่ง

ไปปริมาณครึ่งของวัคซีน 0.25 ml ที่เหลือในหลอดคือปริมาณยาที่ใช้ในการฉีด ดูหัวข้อ 4.2

ยาที่ใส่ในขวดยาที่เหลือ ควรถูกกำจัดตามข้อกำหนัด

7. ชื่อผู้รับอนุญาตผลิตหรือจำหน่ายยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

ผู้นำเข้า: บริษัทร อีแอมบอดี ลาบอแรตอรีส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิต: บริษัท อีแอมบอดี ไบโบลอจิคัลส์ บี.วี.

Abbott Biologicals B.V., Veerweg 12, NL-8121 AA Olst

ประเทศเนเธอร์แลนด์

8. วันที่มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร

จำนวน 2563

(RDCCDS000650/2)

Abbott
1127298

2. แบบ Single dose (GC Flu)

จีซี ฟลู (บรรจุในกระบอกฉีดยาพร้อมฉีดยา และขวดบรรจุยา)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ชนิดแยกส่วนไวรัสและทำให้เชื้ออ่อนกำลัง)

ลักษณะยา

จีซี ฟลู เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่บรรจุในกระบอกฉีดยาพร้อมฉีดยา และขวดบรรจุยา เป็นของเหลวใสสีขาวเล็กน้อยซึ่งผลิตจากการแยกส่วนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และนำมาทำให้อ่อนฤทธิ์ลง โดยเฉพาะเชื้อไวรัสในช่องว่างของไข่ไก่ฟักเพื่อคงคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามแผนดินแดนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในฤดูทำให้อ่อนฤทธิ์ลงโดยวิธีที่ปลอดภัยและวัคซีนนี้ตรงตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับฤดูกาลปี 2021

ข้อบ่งใช้

ใช้ป้องกันไข้หวัดใหญ่

ขนาดและวิธีบริหารยา

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อตามขนาดยาต่อไปนี้ และจำเป็นต้องได้รับวัคซีนปีละหนึ่งครั้งทุกปีในขนาดยาและปริมาณเท่าเดิม

- อายุ 6 เดือน - 35 เดือน ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งเดียว ขนาด 0.25 มล. (7.5 ไมโครกรัม)
- อายุ 3-8 ปี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ขนาด 0.5 มล. (15 ไมโครกรัม)
- อายุ 9 ปีขึ้นไป ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ขนาด 0.5 มล. (15 ไมโครกรัม)

เด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่เคยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาก่อน ควรฉีดวัคซีน 2 ครั้ง เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์

ส่วนประกอบ

1 กระบอกฉีดยาพร้อมฉีดยา ขนาดบรรจุ 0.5 มล. และ 1 ขวดบรรจุยา ขนาดบรรจุ 0.5 มล. ประกอบด้วย

ด้วยยาสำคัญ :

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen
Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type A [A/Victoria/2570/2019 NR-215 (H1N1)] 15 มก.
Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type A [A/Hong Kong/2671/2019 NIB-121 (H3N2)] 15 มก.

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type B [B/Washington/02/2019] 15 มก.
Sodium chloride 4 มก.
Potassium chloride 0.1 มก.
Disodium hydrogen phosphate dihydrate 0.6 มก.
Potassium dihydrogen phosphate 0.1 มก.
Water for injection q.s
เติมฉีดยา (ชนิดใช้ครั้งเดียวและปราศจากเชื้อ) (25G x 5/8 (0.5x16 มม)) 1 หน่วย

1 กระบอกฉีดยาพร้อมฉีดยา ขนาดบรรจุ 0.25 มล. ประกอบด้วย

ด้วยยาสำคัญ :

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen
Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type A [A/Victoria/2570/2019 NR-215 (H1N1)] 7.5 มก.
Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type A [A/Hong Kong/2671/2019 NIB-121 (H3N2)] 7.5 มก.

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type B [B/Washington/02/2019] 7.5 มก.
Sodium chloride 2 มก.
Potassium chloride 0.05 มก.
Disodium hydrogen phosphate dihydrate 0.3 มก.
Potassium dihydrogen phosphate 0.05 มก.
Water for injection q.s
เติมฉีดยา (ชนิดใช้ครั้งเดียวและปราศจากเชื้อ) (25G x 5/8 (0.5x16 มม)) 1 หน่วย

ข้อควรระวัง

1. ข้อห้ามใช้

ควรพิจารณาผู้ที่จะรับวัคซีน โดยการซักประวัติและสำรวจด้วยตา หากจำเป็นอาจต้องตรวจโดยการฟังและเคาะปอด ห้ามใช้ วัคซีนกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากโรคติดต่อทางภูมิคุ้มกันต่อไปนี้

แต่อาจให้วัคซีนในกรณีที่เกิดอันตรายจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญจากการฉีดวัคซีน

- ผู้ป่วยที่มีไข้หรือผู้ที่มีการขาดอาหาร
- ผู้ที่มีการตอบสนองต่อวัคซีนหรือแพ้โปรตีนไข่ไก่ ไข่ขาว หรือส่วนผสมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ป่วยที่มีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคตับ ทั้งชนิดเฉียบพลัน ชนิดค่อย ๆ รุนแรงหรือชนิดที่กำเริบซ้ำ
- ผู้ป่วยในระยะเฉียบพลันหรือผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้น
- ผู้ที่เกิดอาการแพ้ยารุนแรงต่อส่วนประกอบใด ๆ ของจีซี ฟลู
- ผู้ที่แพ้ไข่ ไก่ ส่วนประกอบใด ๆ ของไข่และจีซี ฟลู
- ผู้ป่วยที่มีไข้ภายใน 2 วัน หรือมีอาการแพ้ เช่น เกิดผื่นทั่วตัว หลังจากได้รับวัคซีนในครั้งก่อน
- ผู้ที่มีอาการของโรค Guillain-Barre syndrome ภายใน 6 สัปดาห์
- หลังจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในครั้งก่อน หรือผู้ที่มี อาการผิดปกติของระบบประสาท
- ผู้ที่อยู่ในภาวะที่ไม่แข็งแรงพอที่จะฉีดวัคซีน นอกเหนือจากการนี้ข้างต้น

2. กรณีที่ต้องฉีดอย่างระมัดระวัง

- สตรีมีครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์
- ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดชนิดเรื้อรัง ระบบหายใจผิดปกติชนิดเรื้อรัง หรือเบาหวาน ซึ่งอาการจะแย่ ลงอย่างมาหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
- กรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ ต้องดูแลให้ได้รับวัคซีนอย่างระมัดระวังหากจำเป็นต้องฉีด

3. ปฏิกริยาไม่พึงประสงค์

- อาจเกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่ขึ้นได้ อาทิเช่น แดง บวม และปวดหรือปฏิกิริยาที่ระบบของร่างกาย อาทิเช่น มีไข้ ล้น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และอาเจียน แต่อาการเหล่านี้โดยปกติจะหายไปในภายใน 2-3 วัน
- การอักเสบของสมองและไขสันหลัง (Encephalomyelitis) : ในผู้ป่วยบางรายซึ่งพบได้ไม่บ่อย อาจเกิดการอักเสบของสมองและ ไขสันหลังชนิดเฉียบพลัน (Acute diffuse encephalomyelitis, ADEM) โดยมักเกิดอาการใช้ ปวดศีรษะ ชัก การเคลื่อนไหว ผิดปกติ และการรับรู้ผิดปกติ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีน หากสงสัยว่าจะเกิดอาการเหล่านี้ ต้องให้การรักษาย่างเหมาะสมโดยการวินิจฉัยด้วย MRI และอื่นๆ
- อาการแพ้ หรือการช็อคเนื่องจากการแพ้ยาอย่างรุนแรง อาจเกิดได้แต่พบน้อยมาก
- อาจเกิดความผิดปกติชั่วคราวของระบบประสาทที่ระบบและเฉพาะที่ขึ้นได้บ้างแต่พบน้อยมาก และมีการรายงานการเกิด อาการอ่อนแรง ปวดปลายประสาท เลือดออกในสมอง หรือการอักเสบของระบบประสาท (เช่น โรค Guillain-Barre syndrome)
- ความปลอดภัยของยา จีซี ฟลู นั้นประเมินจากการใช้วัคซีนกับเด็กจำนวน 226 คน (อายุ 6 เดือน ถึงต่ำกว่า 18 ปี) ผู้ใหญ่ จำนวน 803 คน (18 ปี ถึงต่ำกว่า 60 ปี) และผู้สูงอายุจำนวน 173 คน (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังนี้ พบว่ามีการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เป็นจำนวน 849 ราย จากจำนวนทั้งหมด 1202 ราย (70.63%) เป็นเด็ก 74.78% ผู้ใหญ่ 74.10% และ ผู้สูงอายุ 49.13% ส่วนใหญ่เป็นอาการข้างเคียงที่ต้องสืบหา (68.55%) และเป็นอาการข้างเคียงที่ไม่ต้องสืบหา 139 ราย (11.56%) อาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับยา 48 ราย (3.99%)

(1) อาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งถูกรวบรวมเป็นเวลา 6 วัน หลังจากฉีดวัคซีน แสดงไว้ดังตารางด้านล่างนี้

	จำนวนทั้งหมด N = 1202		เด็ก N = 226		ผู้ใหญ่ N = 803		ผู้สูงอายุ N = 173	
	รวม	ปานกลาง และรุนแรง	รวม	ปานกลาง และรุนแรง	รวม	ปานกลาง และรุนแรง	รวม	ปานกลาง และรุนแรง
ปวด	46.9%	0.5%	50.0%	1.3%	50.6%	0.4%	26.0%	0.0%
อาการเจ็บเมื่อกด	52.3%	1.2%	52.7%	2.2%	57.8%	1.0%	26.6%	1.2%
ผื่น / แดง	11.3%	2.6%	26.1%	7.1%	7.6%	1.5%	9.3%	1.7%
อาการไม่พึง ประสงค์ เป็นได้ทั้ง / บวม	4.5%	1.0%	11.5%	3.1%	2.9%	0.6%	2.9%	0.0%
ไข้	0.8%	0.3%	3.1%	1.3%	0.1%	0.0%	0.6%	0.6%

ปวดศีรษะ	17.6%	1.9%	9.7%	1.8%	20.7%	2.4%	13.3%	0.0%
อ่อนเพลีย	10.8%	1.1%	9.3%	0.9%	12.3%	1.3%	5.8%	0.6%
หนาวสั่น	8.8%	1.1%	5.8%	0.9%	10.0%	1.3%	7.5%	0.6%
อ่อนแรง	22.9%	2.1%	19.0%	1.3%	25.9%	2.2%	13.9%	2.3%
เหนื่อย	6.3%	0.8%	6.2%	0.9%	6.2%	1.0%	6.9%	0.0%
ปวดกล้ามเนื้อ	17.5%	1.8%	13.7%	2.7%	20.2%	1.9%	9.8%	0.6%
ปวดข้อ	4.1%	0.3%	3.1%	0.0%	4.1%	0.4%	5.2%	0.6%

- อาการไม่พึงประสงค์แบบรุนแรงพบว่ามีรายงานอยู่ 5 ราย ที่น้อยกว่า 1 ราย ที่มีการฉีดวัคซีนที่แพ้ได้รับการประเมินว่า "ไม่เกี่ยวข้อง" (ปวดท้องชนิด 1 ราย ปวดแขน 1 ราย) หรือ "น่าจะเกี่ยวข้อง" (กระเพาะลำไส้เล็ก 2 ราย , หลอดลมอักเสบ 1 ราย)
- อาการไม่พึงประสงค์ที่รวบรวมเป็นเวลา 21 วันหลังฉีดวัคซีน พบรายงาน 139 ราย (11.56%) จากจำนวน 1202 ราย อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ ความผิดปกติทางระบบหายใจ (64 ราย , 5.32%) และทุกรายที่มีอาการไม่พึงประสงค์หายเป็นปกติโดยไม่มีอาการตกค้าง
- อาการผิดปกติซึ่งไม่สามารถระบุสาเหตุความเกี่ยวข้อง กับ จีซี ฟลูได้มี 48 ราย (3.99%) ดังนี้ (พบบ้าง : 0.1% ถึง <5% พบน้อย : < 0.1 %)

• ระบบหัวใจ

พบบ้าง : หัวใจ , น้ำมูกไหล , เจ็บคอ , คออักเสบ , จมูกอักเสบ
พบน้อย : ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน , ไอ , หลอดลมอักเสบ

• ระบบทางเดินหายใจ

พบน้อย : กระเพาะและลำไส้เล็ก , อาเจียน , ท้องเสีย , คลื่นไส้

• ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย

พบบ้าง : มึนงง

พบน้อย : ตะคริวที่ขา , ปวดศีรษะไมเกรน , กล้ามเนื้อหดตัวโดยไม่ตั้งใจ

• ผิวหนัง

พบบ้าง : คัน

พบน้อย : ลมพิษ

• ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน

พบน้อย : ความรู้สึกผิดปกติที่ในอุ้งเท้า , กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

• ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ

พบน้อย : สิ้นใจ

• ระบบเซลล์ภูมิคุ้มกันและเม็ดเลือดขาว

พบน้อย : จำนวนเม็ดเลือดขาวผิดปกติ

• ระบบจิตเวช

พบน้อย : การนอนหลับผิดปกติ

• ผลข้างเคียงเฉพาะที่และทั่วตัว

พบบ้าง : คันบริเวณที่ฉีดวัคซีน , บวมและคัน

พบน้อย : เป็นผื่นแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน , เป็นลม , อ่อนแรง ช็อค

• ระบบหัวใจและหลอดเลือด

พบน้อย : ใจสั่น

4. ข้อควรระวังทั่วไป

- แนะนำให้ผู้รับวัคซีนหรือผู้ปกครองว่าเมื่อรับวัคซีนแล้วให้รักษาสภาพให้อยู่ในสภาวะสมดุล รักษาความสะอาดบริเวณที่ฉีด หากเกิดไข้สูง ชัก ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน
- การสร้างแอนติบอดีเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันจะไม่เพียงพอ หากเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากสาเหตุภายในหรือจากภายนอก
- ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนฤดูระบาด (กันยายน - พฤศจิกายน) การฉีดวัคซีนนี้สามารถเลื่อนกำหนดได้ ขึ้นกับสถานการณ์ การระบาดของโรค
- การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรใช้วัคซีนที่ผลิตจากสายพันธุ์ประจำปีนี้
- อันตรกิริยากับยาอื่น**
 - จากการศึกษาไม่พบข้อมูลหรือการศึกษาเกี่ยวกับการใช้วัคซีน จีซี ฟลู ร่วมกับวัคซีนอื่น หากหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับวัคซีนอื่นไม่ได้ ควรฉีดคนละตำแหน่งและควรระมัดระวังว่าการไม่พึงประสงค์อาจเพิ่มขึ้นได้
 - การสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีน สามารถถูกระงับจากการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกันตามอื่น หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีอยู่ก่อน
 - อาจเกิดผลลบจากผลจากการตรวจด้วยวิธี ELISA สำหรับตรวจ HIV-1 ตัวยกเลบซี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง HTLV-1 หลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผลบวกอาจเกิดขึ้นเร็วขึ้นชั่วคราว อาจเกิดเนื่องจากวัคซีนเป็นกระตุ้น IgM ออกมาโดยข้ามเชือก (cross-reactive)
 - แนะนำให้ผู้รับวัคซีน หรือผู้ปกครองว่าเมื่อได้รับวัคซีนแล้วให้รักษาสภาพให้อยู่ในสภาวะสมดุล รักษาความสะอาดบริเวณที่ฉีด หากเกิดไข้สูง ชัก ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน
 - ผลิตภัณฑ์ยาต่อไปนี้ อาจมีปฏิกิริยากับจีซี ฟลู
 - (1) ยาที่ใช้ควบคุมอาการชัก หรือ paroxysmal (Phenytoin, Carbamazepine, Phenobarbitone)
 - (2) Theophylline
 - (3) Warfarin
 - (4) Immune globulin
 - (5) สารกดภูมิคุ้มกัน (Corticosteroid, Cyclosporine, ยาต้านมะเร็ง (รวมถึงการฉายรังสีรักษา) และอื่นๆ)

6. การใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร

- ไม่มีการศึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนในสตรีมีครรภ์ และสตรีมีครรภ์มากกว่า วัคซีนจีซี ฟลู จึงควรใช้กับสตรีมีครรภ์หรือสงสัยว่ามีครรภ์ เฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น
- ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า จีซี ฟลู ถูกขับถ่ายออกจากร้านนมมารดาได้หรือไม่ เนื่องจากมีหลายชนิดถูกขับออกทางนมมารดาได้ จึงควรต้องระมัดระวังหากฉีดจีซี ฟลู ให้กับสตรีระหว่างให้นมบุตร

7. ข้อควรระวังในการบริหารยา

- ก่อนใช้ต้องตรวจด้วยสายตาว่ามีอนุภาคหรือสิ่งผิดปกติหรือไม่ หากพบความผิดปกติใดๆ ห้ามใช้ทันที
- มักฉีดวัคซีนที่บริเวณหัวไหล่ และต้องพาดเข็มบริเวณนอกรัศมี เอานอน หรือทิ้งเข็มทิ้งขว้าง
- ควรหลีกเลี่ยงการฉีดซ้ำที่เดิม
- ห้ามฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
- ปลายเข็มที่ฉีดต้องไม่เข้าสู่หลอดเลือด
- ห้ามผสมรวมกับวัคซีนชนิดอื่น

8. ข้อควรระวังในการดูแลยา

- ห้ามใช้หากวัคซีนที่ถูกแช่แข็งแล้ว
- ต้องแช่ยาวัคซีนให้เย็นเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้
- เมื่อเปิดแล้วควรใช้ทันที

9. อื่นๆ

สายพันธุ์ที่ใช้และปริมาณยาได้แจ้งไว้ในเอกสารกำกับยา

10. การเก็บรักษา

เก็บยาที่ 2-8 องศาเซลเซียส (โดยห้ามแช่แข็ง) ในภาชนะป้องกันความชื้นและป้องกันแสง อายุการใช้งาน 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต

11. ขนาดบรรจุ

0.5 มล. ในกระบอกฉีดยาพร้อมฉีดยา และ 0.5 มล. ในขวดบรรจุยา x หน่วยบรรจุของบริษัท

0.25 มล. ในกระบอกฉีดยาพร้อมฉีดยา x หน่วยบรรจุของบริษัท

ผู้ผลิต Green Cross Corporation ประเทศเกาหลี
ผู้นำเข้า บริษัท คอสมา เมดิคอล จำกัด กรุงเทพฯ

GC FLU

Pre-filled Syringe_{vi}, Vial_{vi}
Influenza Vaccine (Split Virion, Inactivated)

[Description]

GC FLU is pre-filled syringe and vial containing colorless or slightly whitish liquid made by splitting and inactivating influenza virus cultured by inoculating in the allantoic cavity of embryonated egg in order to maintain antigenicity.

Influenza virus antigen is inactivated with formaldehyde and this vaccine complies with the WHO recommendations for the 2021 Season.

[INDICATIONS]

Prophylaxis against Influenza

[DOSAGE & ADMINISTRATION]

An intramuscular injection of the following doses and immunization of one dose is necessary in every year at same volume.

- 1) 6 ~ 35 months old : A single dose of 0.25mL (7.5 µg) intramuscular injection
- 2) 3 ~ 8 years old : A single dose of 0.5mL (15 µg) intramuscular injection
- 3) 9 years and older : A single dose of 0.5mL (15 µg) intramuscular injection

The children younger than 9 years of age who have not been vaccinated or have not been infected by influenza should be vaccinated two doses at an interval of at least 4 weeks.

[Composition]

1 pre-filled syringe 0.5mL and 1 Vial 0.5 mL contain,

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type A [A/Victoria/2570/2019 (H1N1)] 15 µg

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type A [A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)] 15 µg

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type B [B/Washington/02/2019] 15 µg

Sodium chloride 4 mg

Potassium chloride 0.1 mg

Dipotassium hydrogen phosphate dihydrate 0.6 mg

Potassium dihydrogen phosphate 0.1 mg

Water for injection q.s

Needle (Sterilized disposable needle) (25G x 5/8 (0.5 x 16mm)) 1 ea

1 pre-filled syringe 0.25mL contains,

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type A [A/Victoria/2570/2019 (H1N1)] 7.5 µg

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type A [A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)] 7.5 µg

Purified Inactivated Influenza Virus Antigen Type B [B/Washington/02/2019] 7.5 µg

Sodium chloride 2 mg

Potassium chloride 0.05 mg

Dipotassium hydrogen phosphate dihydrate 0.3 mg

Potassium dihydrogen phosphate 0.05 mg

Water for injection q.s

Needle (Sterilized disposable needle) (25G x 5/8 (0.5 x 16mm)) 1 ea

[PRECAUTIONS FOR USE]

1. Contraindications

Examine vaccinee by history taking and visual inspection and if necessary, by auscultation and percussion. Then, vaccination is prohibited when vaccinee is diagnosed as one of the following cases. But vaccination can be performed in case that there is a danger of infection with Influenza virus and no possibility to cause significant disorder by vaccination.

- 1) Febrile patient or the person with malnutrition.
- 2) Person with acute, or gradually serious or active cardiovascular, kidney and liver disease.
- 3) Patients with acute respiratory disease or other active infectious disease.
- 4) Patients in latent period and convalescence.
- 5) Person who showed anaphylaxis by the components of GC FLU.
- 6) Person with hypersensitivity to egg, chicken, any other chicken component, and GC FLU component.
- 7) Person who had fever within 2 days or a symptom of allergy such as generalized rash after the injection at previous vaccination
- 8) Person who showed Guillain-Barre syndrome within 6 weeks from the previous influenza vaccination or person with neurological disorders.
- 9) Person whose state is not healthy enough to be vaccinated besides the above cases.

2. Inject with care

- 1) Pregnant woman or those suspected to be pregnant.
- 2) Person who has chronic cardiovascular disorders, chronic respiratory disorders or diabetes can be markedly deteriorated if the person is infected with influenza. Accordingly, inject with care if vaccination is needed.

3. Adverse reactions

- 1) There is the possibility of local reactions such as redness, swelling and pain, or systemic reactions such as fever, rigor, headache, fatigue and vomiting. But they usually disappear within 2-3 days.
- 2) Encephalomyelitis: In rare cases, acute diffuse encephalomyelitis (ADEM) may occur. Fever, headache, convulsions, dyskinesia and consciousness disorder usually occur within 2 weeks following the administration of the vaccine. When these symptoms are suspected, appropriate medical treatment should be available by diagnosis with MRI and so on.
- 3) Allergic reaction or anaphylactic shock may occur in very rare cases.
- 4) Transient disorders of systemic and local nervous system may rarely occur. And palsy, neuralgia, cerebral hemorrhage or inflammation of the nervous system (ex. Guillain-Barre syndrome) have been reported.
- 5) Safety of GC FLU was evaluated regarding 226 children (6 months ~ under 18 years), 803 adults (18 years ~ under 60 years) and 173 elderly (60 years ~), and the adverse events are as follows.

849(70.63%) out of 1,202 subjects showed adverse events ; Children 74.78%, adults 74.10% and elderly 49.13%. Most of them were solicited adverse events (68.55%), and unsolicited adverse events were 139(11.56%). Drug related adverse events were 48(3.99%).

① Adverse events which were collected for 6 days after vaccination are listed as below table.

		All subjects (N=1,202)		Children (N=226)		Adults (N=803)		Elderly (N=173)	
		Total	Moderate And Severe	Total	Moderate And Severe	Total	Moderate And Severe	Total	Moderate And Severe
Local Adverse events	Pain	46.9%	0.5%	50.0%	1.3%	50.6%	0.4%	26.0%	0.0%
	Tenderness	52.3%	1.2%	52.7%	2.2%	57.8%	1.0%	26.6%	1.2%
	Erythema/Redness	11.3%	2.6%	26.1%	7.1%	7.6%	1.5%	9.3%	1.7%
	Induration/Swelling	4.5%	1.0%	11.5%	3.1%	2.9%	0.6%	2.9%	0.0%
Systemic Adverse events	Fever	0.8%	0.3%	3.1%	1.3%	0.1%	0.0%	0.6%	0.6%
	Headache	17.6%	1.9%	9.7%	1.8%	20.7%	2.4%	13.3%	0.0%
	Malaise	10.8%	1.1%	9.3%	0.9%	12.3%	1.3%	5.8%	0.6%
	Shivering	8.8%	1.1%	5.8%	0.9%	10.0%	1.3%	7.5%	0.6%
	Fatigue	22.9%	2.1%	19.0%	1.3%	25.9%	2.2%	13.9%	2.3%
	Sweating	6.3%	0.8%	6.2%	0.9%	6.2%	1.0%	6.9%	0.0%
	Myalgia	17.5%	1.8%	13.7%	2.7%	20.2%	1.9%	9.8%	0.6%
	Arthralgia	4.1%	0.3%	3.1%	0.0%	4.1%	0.4%	5.2%	0.6%

② Serious adverse events were reported 5 subjects. Except for 1 case (convulsion), the rest were evaluated as 'not related' (acute convulsive abdominal pain : 1 case, atelectasis : 1 case), or 'possibly not related' (gastroenteritis : 2 cases, bronchitis : 1 case).

③ Adverse events were collected for 21 days after vaccination, and they were reported 139 subjects (11.56%) among 1,202 subjects. The most frequent events were respiratory adverse events (64 subjects, 5.32%), and all subjects who had experienced adverse events were recovered without sequelae. Adverse events of which relativity can not be excluded from GC FLU were 48 subjects (3.99%) as follows.
(Occasionally: 0.1%~<5%; Rare: <0.1%)

Respiratory System

- Occasionally: Coryza, Rhinorrhoea, Throat sore, Pharyngitis, Rhinitis
- Rare: Upper Respiratory tract infection, coughing, Bronchitis

Gastro-Intestinal System

- Rare: Gastroenteritis, vomiting, Diarrhoea, Nausea

Central & Peripheral Nervous System

- Occasionally: Dizziness
- Rare: Cramps legs, Migraine, Muscle contractions involuntary

Skin & Appendages

- Occasionally: Pruritus
- Rare: Urticaria

Vision Disorder

- Rare: Abnormal sensation in eye, Asthenopia

Metabolic and Nutritional disorder

- Rare: Edema uvula

White Cell and Rest Disorders

- Rare: WBC abnormal nos.

Psychiatric Disorders

- Rare: Sleep disorder

Local and systemic adverse events

- Occasionally: Injection site pruritus, Swelling and Pruritus
- Rare: Injection site erythema, Syncope, Fatigue, Pallor

Cardiovascular disorder

- Rare: Palpitation

4. General precautions

- 1) Advise the vaccinee or their guardians that the vaccinee should keep equilibrium, keep the injection site clean, and when the symptoms of high fever, convulsion appear, they should consult a physician quickly.
- 2) Antibody reaction can not be sufficient in endogenous or iatrogenic immune deficient patients.
- 3) Influenza should be vaccinated (September~November) before prevailing. Vaccination can be delayed according to epidemiological situation.
- 4) Influenza should be vaccinated with the influenza vaccines produced with current-year-recommended strains.

5. Interaction with other medicinal products

- 1) There is no data or study on co-administration of GC FLU with other vaccines. If co-administration is inevitably required, injection site should be different. It should be noted that the adverse events may be increased.
- 2) Immunization can be affected by concomitant immunosuppressive therapy or an existing immunodeficiency.
- 3) False positive ELISA serologic tests for HIV-1, Hepatitis C, and especially HTLV-1 may occur following influenza vaccination. These transient false-positive results may be due to cross-reactive IgM elicited by the vaccine.
- 4) Advise the vaccinee or their guardians that the vaccinee should keep equilibrium, keep the injection site clean, and when the symptoms of high fever, convulsion appear, they should consult a physician immediately.
- 5) Following medicinal products may cause interaction with GC FLU
 - ① Medicinal products in order to control epilepsy or paroxysmal (Phenytoin, carbamazepine, Phenobarbitone)
 - ② Theophylline
 - ③ Warfarin
 - ④ Immune globulin
 - ⑤ Immune inhibitory agents (corticosteroid, Cyclosporine, anticancer drug(including radiation therapy) etc.)

6. Administration for pregnant or lactating women

- 1) Studies for animals and pregnant women have not been conducted with GC FLU. GC FLU should be given to pregnant or pregnant-suspect women only when necessary.
- 2) It is not known whether GC FLU is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk, caution should be exercised when GC FLU is administered to a nursing women.

7. Precautions in administration

- 1) Before use check this product visually for particles or discoloration. If either is present, do not use.
- 2) The injection site is usually lateral upper arm and disinfected with ethanol or tincture of iodine. Repeated injections at the same site should be avoided.
- 3) Intravenous administration is prohibited.
- 4) The tip of needle should not penetrate blood vessel.
- 5) Do not mix with other vaccines in same syringe.

8. Precautions in Handling

- 1) Do not use if the vaccine has been frozen.
- 2) The vaccine should be shaken well and mixed homogeneously before use.
- 3) The product should be used immediately once opened.

9. Miscellaneous

The used strain and unit are included in this leaflet.

10. Storage

Store at 2~8 °C without freezing in hermetic container and protect from light.
Shelf life: 12 months from the date of manufacture

11. How supplied

0.5mL pre-filled syringe and 0.5 mL vial x In-house packing unit
0.25mL pre-filled syringe x In-house packing unit

