


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 3 (15–21 มกราคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–21 มกราคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 3,925 ราย อัตราป่วย 5.93 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0–4 ปี เท่ากับ 27.71 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5–14 ปี (19.21) และกลุ่มอายุ 25–34 ปี (4.95) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-21 มกราคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคใต้ เท่ากับ 12.94 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (7.50) ภาคกลาง (4.11) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3.89) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พัทลุง อัตราป่วย 62.79 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (31.29) เชียงใหม่ (17.06) แพร่ (15.93) น่าน (14.66) เชียงราย (14.19) นครศรีธรรมราช (14.07) ยะลา (13.77) สงขลา (12.50) และตรัง (10.28) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	พัทลุง	62.79
2	ภูเก็ต	31.29
3	เชียงใหม่	17.06
4	แพร่	15.93
5	น่าน	14.66
6	เชียงราย	14.19
7	นครศรีธรรมราช	14.07
8	ยะลา	13.77
9	สงขลา	12.50
10	ตรัง	10.28

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-21 มกราคม 2566


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-21 มกราคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 481 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.90 แยกเป็นชนิด B จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 31.58) ชนิด A/H3N2 จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 55.26) และชนิด A/H1N1 (2009) 5 ราย (ร้อยละ 13.16) ในสัปดาห์ที่ 3 (ระหว่างวันที่ 15 มกราคม-21 มกราคม) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 184 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 12 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.96 แยกเป็นชนิด B จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 18.18) ชนิด A/H3N2 จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 63.64) และชนิด A/H1N1 (2009) 4 ราย (ร้อยละ 18.18) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 184 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563–21 มกราคม 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–21 มกราคม 2566 ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564–21 มกราคม 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา