


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายงานผู้ป่วย 11,597 ราย อัตราป่วย 17.53 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 79.40 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (63.82) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (12.46) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคใต้ เท่ากับ 27.14 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (24.74) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (13.55) และภาคกลาง (13.40) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พัทลุง อัตราป่วย 115.27 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ แพร่ (104.20) ภูเก็ต (47.65) เชียงใหม่ (44.22) อุบลราชธานี (38.56) น่าน (37.28) เชียงราย (36.79) ยะลา (35.35) กรุงเทพมหานคร (30.85) และนราธิวาส (28.28) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	พัทลุง	115.27
2	แพร่	104.20
3	ภูเก็ต	47.65
4	เชียงใหม่	44.22
5	อุบลราชธานี	38.56
6	น่าน	37.28
7	เชียงราย	36.79
8	ยะลา	35.35
9	กรุงเทพมหานคร	30.85
10	นราธิวาส	28.28

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2566


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,074 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.31 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 65 ราย (ร้อยละ 65.00) ชนิด B จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 26.00) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 9.00) ในสัปดาห์ที่ 6 (ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์-11 กุมภาพันธ์ 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 201 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.94 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 57.69) ชนิด B จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 34.62) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 7.69) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 201 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563–11 กุมภาพันธ์ 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–11 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 2 เหตุการณ์ จากจังหวัดแพร่ และสงขลา ในสัปดาห์ที่ 6 (ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์–11 กุมภาพันธ์ 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เหตุการณ์ โดยพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 329 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสงขลา เริ่มพบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 10 ราย ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ผลพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 100) อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลการสอบสวนโรคเพิ่มเติม ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564–11 กุมภาพันธ์ 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา