


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 11 (12-18 มีนาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-18 มีนาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 31,317 ราย อัตราป่วย 47.33 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดสงขลา อัตราป่วยตาย 0.003 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 206.00 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (179.47) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (31.63) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-18 มีนาคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคเหนือ เท่ากับ 63.35 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคใต้ (63.01) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (42.28) และภาคกลาง (36.80) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ เพชร อัตราป่วย 198.62 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ พัทลุง (168.71) อุบลราชธานี (137.42) พะเยา (120.46) เชียงใหม่ (115.72) ภูเก็ต (110.70) กรุงเทพมหานคร (84.22) Mukdahan (83.80) น่าน (82.31) และนครศรีธรรมราช (78.84) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	แพร่	198.62
2	พัทลุง	168.71
3	อุบลราชธานี	137.42
4	พะเยา	120.46
5	เชียงใหม่	115.72
6	ภูเก็ต	110.70
7	กรุงเทพมหานคร	84.22
8	มุกดาหาร	83.80
9	น่าน	82.31
10	นครศรีธรรมราช	78.84

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-18 มีนาคม 2566


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-18 มีนาคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 2,105 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 231 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.97 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 135 ราย (ร้อยละ 58.44) ชนิด B จำนวน 70 ราย (ร้อยละ 30.30) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 11.26) ในสัปดาห์ที่ 11 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม-18 มีนาคม) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 204 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.73 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 50.00) ชนิด B จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 35.71) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 14.29) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 204 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–18 มีนาคม 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–18 มีนาคม 2566 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 7 เหตุการณ์ จากจังหวัดแพร่ สงขลา ร้อยเอ็ด อุตรธานี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน และพะเยา ในสัปดาห์ที่ 11 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม–18 มีนาคม) ไม่มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565-18 มีนาคม 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา