


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 14 (2-8 เมษายน 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 เมษายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 39,703 ราย อัตราป่วย 60.04 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดสงขลา อัตราป่วยตาย 0.003 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H1N1 สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 295.02 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (225.23) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (42.36) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 เมษายน 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคใต้ เท่ากับ 78.56 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคเหนือ (77.29) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (54.98) และภาคกลาง (47.48) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ แพร่ อัตราป่วย 209.31 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ พะเยา (209.00) พัทลุง (198.29) อุบลราชธานี (178.27) เชียงใหม่ (137.16) ภูเก็ต (125.14) น่าน (103.46) นราธิวาส (103.07) กรุงเทพมหานคร (102.06) และนครศรีธรรมราช (99.59) ตามลำดับ

ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	แพร่	209.31
2	พะเยา	209.00
3	พัทลุง	198.29
4	อุบลราชธานี	178.27
5	เชียงใหม่	137.16
6	ภูเก็ต	125.14
7	น่าน	103.46
8	นราธิวาส	103.07
9	กรุงเทพมหานคร	102.06
10	นครศรีธรรมราช	99.59

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-8 เมษายน 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 เมษายน 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 2,641 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.36 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 149 ราย (ร้อยละ 54.58) ชนิด B จำนวน 86 ราย (ร้อยละ 31.50) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 38 ราย (ร้อยละ 13.92) ในสัปดาห์ที่ 14 (ระหว่างวันที่ 2 เมษายน-8 เมษายน) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 162 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.13 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 50.00) ชนิด A/H3N2 จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 37.50) ชนิด B จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 12.50) และอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 6 ราย จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 162 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–8 เมษายน 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–8 เมษายน 2566 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 12 เหตุการณ์ จากจังหวัด ร้อยเอ็ด แพร่ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ รองลงมาเป็น สงขลา อุดรธานี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน พะเยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร และนราธิวาส จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 14 (ระหว่างวันที่ 2 เมษายน–8 เมษายน) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2 เหตุการณ์ รายละเอียดดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 53 ราย ในวัดแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ และมีน้ำมูก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A จำนวน 7 ราย จากนั้นส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 3 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3 ทั้งหมด (ร้อยละ 100)

2) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 18 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดนราธิวาส พบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab ส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อ จำนวน 10 ราย ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565–8 เมษายน 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา