


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 20 (14-20 พฤษภาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-20 พฤษภาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 49,884 ราย อัตราป่วย 75.39 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดสงขลา อัตราป่วยตาย 0.002 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 381.62 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (257.96) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (57.92) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-20 พฤษภาคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคใต้ เท่ากับ 103.17 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (92.15) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (69.11) และภาคกลาง (60.39) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา อัตราป่วย 231.56 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ แพร่ (223.64) พัทลุง (216.81) อุบลราชธานี (208.45) ภูเก็ต (162.93) เชียงใหม่ (161.46) นราธิวาส (149.83) ขอนแก่น (137.15) นครศรีธรรมราช (132.04) และมุกดาหาร (125.84) ตามลำดับ
ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	พะเยา	231.56
2	แพร่	223.64
3	พิจิตร	216.81
4	อุบลราชธานี	208.45
5	ภูเก็ต	162.93
6	เชียงใหม่	161.46
7	นราธิวาส	149.83
8	ขอนแก่น	137.15
9	นครศรีธรรมราช	132.04
10	มุกดาหาร	125.84

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-20 พฤษภาคม 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-20 พฤษภาคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 3,582 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.21 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 166 ราย (ร้อยละ 50.30) ชนิด B จำนวน 97 ราย (ร้อยละ 29.40) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 67 ราย (ร้อยละ 20.30) ในสัปดาห์ที่ 20 (ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-20 พฤษภาคม) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 138 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.90 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 50.00) และชนิด B จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 50.00) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 138 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–20 พฤษภาคม 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–20 พฤษภาคม 2566 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 16 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด แพร่ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ รองลงมาเป็น สงขลา อุตรธานี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน พะเยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี และนราธิวาส จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 20 (ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม–20 พฤษภาคม 2566) ไม่มีรายงานเหตุการณ์การระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังรูปที่ 5



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา