


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2565 ประจำสัปดาห์ที่ 34 (21-27 สิงหาคม 2565)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 สิงหาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วย 20,125 ราย อัตราป่วย 30.98 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564, 2565
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 125.65 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (47.91) และกลุ่มอายุ 25-34 ปี (38.05) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 สิงหาคม 2565

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 49.54 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคใต้ (45.30) ภาคเหนือ (25.68) และภาคกลาง (8.14) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ อุตรดิตถ์ อัตราป่วย 535.34 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ นราธิวาส (150.08) พะเยา (104.07) พัทลุง (75.39) ยะลา (69.03) ภูเก็ต (61.37) อุบลราชธานี (59.71) เชียงราย (54.60) ตาก (47.76) และสงขลา (45.10) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	อุดรธานี	535.34
2	นราธิวาส	150.08
3	พะเยา	104.07
4	พัทลุง	75.39
5	ยะลา	69.03
6	ภูเก็ต	61.37
7	อุบลราชธานี	59.71
8	เชียงราย	54.60
9	ตาก	47.76
10	สงขลา	45.10

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-27 สิงหาคม 2565


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 สิงหาคม 2565 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 6,250 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.40 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 138 ราย (ร้อยละ 92.00) ชนิด B จำนวน 11 ราย (ร้อยละ 7.33) และชนิด A/H1N1(2009) 1 ราย (ร้อยละ 0.67) ในสัปดาห์ที่ 34 (ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม-27 สิงหาคม 2565) ได้รับตัวอย่างส่งตรวจทั้งสิ้น 214 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 14 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.55 แยกเป็นชนิด A/H3N2 24 ตัวอย่าง (ร้อยละ 82.76) ชนิด B 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.79) และชนิด A/H1N1(2009) 1 ราย (ร้อยละ 3.45) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 214 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563–27 สิงหาคม 2565

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–27 สิงหาคม 2565 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 7 เหตุการณ์ จากจังหวัดปัตตานี 2 เหตุการณ์ ลำปาง นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 34 (ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม–27 สิงหาคม 2565) ไม่มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564–27 สิงหาคม 2565

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา