


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 34 (20-26 สิงหาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-26 สิงหาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 119,353 ราย อัตราป่วย 180.37 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดสงขลา อัตราป่วยตาย 0.001 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 824.68 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (663.82) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (154.53) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-26 สิงหาคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคใต้ เท่ากับ 263.90 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคกลาง (173.32) ภาคเหนือ (169.94) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (155.70) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พัทลุง อัตราป่วย 606.90 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (576.86) ตรัง (447.12) อุบลราชธานี (419.67) ระยอง (387.60) หนองคาย (387.02) นราธิวาส (350.90) ยโสธร (348.57) จันทบุรี (341.95) และกรุงเทพมหานคร (296.40) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	พัทลุง	606.90
2	ภูเก็ต	576.86
3	ตราด	447.12
4	อุบลราชธานี	419.67
5	ระยอง	387.60
6	หนองคาย	387.02
7	นราธิวาส	350.90
8	ยโสธร	348.57
9	จันทบุรี	341.95
10	กรุงเทพมหานคร	296.40

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-26 สิงหาคม 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-26 สิงหาคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 6,475 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 634 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.79 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 262 ราย (ร้อยละ 41.33) ชนิด A/H3N2 จำนวน 228 ราย (ร้อยละ 35.96) และชนิด B จำนวน 144 ราย (ร้อยละ 22.71) ในสัปดาห์ที่ 34 (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม-26 สิงหาคม 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 231 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.38 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 38 ราย (ร้อยละ 70.37) ชนิด A/H3N2 จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 16.67) และชนิด B จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 12.96) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 231 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–26 สิงหาคม 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–26 สิงหาคม 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 34 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด 3 เหตุการณ์ รองลงมาเป็น แพร่ อุตรธานี นราธิวาส ระยอง กระบี่ สงขลา จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ และเพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน พะเยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก ชัยภูมิ สระแก้ว ยโสธร นครสวรรค์ อุบลราชธานี พิษณุโลก สตูล ชลบุรี ราชบุรี และสุโขทัย จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 34 (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม–26 สิงหาคม 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 3 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 73 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ป่วยรายแรก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 3 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 66.67)

2) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 150 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดราชบุรี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ และอาเจียน ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 9 ราย ที่ห้องปฏิบัติการด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 77.78)

3) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 36 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสุโขทัย เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการไข้ เจ็บคอ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 4 ราย ที่ห้องปฏิบัติการด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 100.00) ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565–26 สิงหาคม 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา