


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 35 (27 สิงหาคม–2 กันยายน 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–2 กันยายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 138,766 ราย อัตราป่วย 209.71 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัดสงขลา และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.001 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0–4 ปี เท่ากับ 910.82 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5–14 ปี (790.91) และกลุ่มอายุ 15–24 ปี (187.87) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-2 กันยายน 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคใต้ เท่ากับ 287.85 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคกลาง (213.76) ภาคเหนือ (199.89) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (175.17) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต อัตราป่วย 643.52 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พัทลุง (613.01) ระยอง (529.44) ตรวต (468.93) อุบลราชธานี (446.75) ยโสธร (418.18) จันทบุรี (373.82) นราธิวาส (372.97) กรุงเทพมหานคร (342.12) และเชียงใหม่ (320.91) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ภูเก็ต	643.52
2	พัทลุง	613.01
3	ระยอง	529.44
4	ตราด	468.93
5	อุบลราชธานี	446.75
6	ยโสธร	418.18
7	จันทบุรี	373.82
8	นราธิวาส	372.97
9	กรุงเทพมหานคร	342.12
10	เชียงใหม่	320.91

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-2 กันยายน 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-2 กันยายน 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 6,673 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 683 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.24 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 290 ราย (ร้อยละ 42.46) ชนิด A/H3N2 จำนวน 244 ราย (ร้อยละ 35.72) และชนิด B จำนวน 149 ราย (ร้อยละ 21.82) ในสัปดาห์ที่ 35 (ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม-2 กันยายน 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 198 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 12 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.75 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 28 ราย (ร้อยละ 57.14) ชนิด A/H3N2 จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 32.65) และชนิด B จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 10.21) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 198 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–2 กันยายน 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–2 กันยายน 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 40 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด 4 เหตุการณ์ รองลงมาเป็น แพร่ อุตรธานี นราธิวาส ระยอง กระบี่ สงขลา ยโสธร ชลบุรี จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน พะเยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก ชัยภูมิ สระแก้ว นครสวรรค์ อุบลราชธานี พิษณุโลก สตูล ราชบุรี สุโขทัย ลำพูน สระบุรี และกาฬสินธุ์ จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 35 (ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม–2 กันยายน 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 6 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 101 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดลำพูน เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ และเจ็บคอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 5 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 80.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 10 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2) ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ 13 ราย ในวัดแห่งหนึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ และปวดตามร่างกาย ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 1 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่

3) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 53 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดยโสธร เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ไอ และเจ็บคอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 2 ราย ที่ห้องปฏิบัติการด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2 ราย (ร้อยละ 100.00) แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 1 ราย และชนิด B จำนวน 1 ราย


4) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 40 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ และเจ็บคอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 9 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 100.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่ห้องปฏิบัติการด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H1N1 (2009) 3 ราย (ร้อยละ 60.00)

5) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 56 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสระบุรี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการไข้สูง ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 10 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 60.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 19 ราย ที่ห้องปฏิบัติการด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H1N1 (2009) 8 ราย (ร้อยละ 42.11)

6) ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ 21 ราย ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการไข้ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ และไอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Antigen Test Kit จำนวน 21 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ดังรูปที่ 5



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565-2 กันยายน 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา