


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 38 (17-23 กันยายน 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-23 กันยายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 216,600 ราย อัตราป่วย 327.33 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 7 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 4 ราย จังหวัดสงขลา ตาก และพิษณุโลก จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.003 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-14 ปี เท่ากับ 1,274.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี (1,245.45) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (319.12) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-23 กันยายน 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง เท่ากับ 380.28 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคใต้ (338.19) ภาคเหนือ (323.11) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (266.70) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 962.15 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (766.50) พัทลุง (638.01) กรุงเทพมหานคร (617.57) อุบลราชธานี (593.24) ยโสธร (591.16) เชียงใหม่ (582.89) ลำพูน (551.62) ตราด (530.43) และชุมพร (503.28) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ระยอง	962.15
2	ภูเก็ต	766.50
3	พัทลุง	638.01
4	กรุงเทพมหานคร	617.57
5	อุบลราชธานี	593.24
6	ยโสธร	591.16
7	เชียงใหม่	582.89
8	ลำพูน	551.62
9	ตราด	530.43
10	ชุมพร	503.28

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-23 กันยายน 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-23 กันยายน 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 7,460 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 885 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.86 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 389 ราย (ร้อยละ 43.95) ชนิด A/H3N2 จำนวน 324 ราย (ร้อยละ 36.61) และชนิด B จำนวน 172 ราย (ร้อยละ 19.44) ในสัปดาห์ที่ 38 (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน-23 กันยายน 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 268 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 12 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.97 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 40 ราย (ร้อยละ 48.19) ชนิด A/H3N2 จำนวน 34 ราย (ร้อยละ 40.97) และชนิด B จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 10.84) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 268 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565-23 กันยายน 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-23 กันยายน 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 49 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด 4 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดกระบี่ สงขลา จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ นราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี เพชรบูรณ์ สุรินทร์ สระบุรี จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก ชัยภูมิ สระแก้ว นครสวรรค์ อุบลราชธานี พิษณุโลก สตูล ราชบุรี สุโขทัย ลำพูน กาฬสินธุ์ สมุทรสงคราม ภูเก็ต และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 38 (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน-23 กันยายน 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 4 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 169 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มพบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยตามร่างกาย ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 20 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 14 ราย (ร้อยละ 70.00)

และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 5 ราย (ร้อยละ 100.00)

2) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 32 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และปวดศีรษะ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่ห้องปฏิบัติการด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 4 ราย (ร้อยละ 80.00) และตรวจพบการติดเชื้อร่วมคือ Streptococcus pneumoniae, Human respiratory syncytial viruses A and B และ Haemophilus influenza 1 ราย

3) ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ 213 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดสุรินทร์ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก และปวดเมื่อยตามร่างกาย อยู่ระหว่างการติดตามและสอบสวนโรคเพิ่มเติม

4) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 37 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดสระบุรี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 3 ราย ที่ห้องปฏิบัติการด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 5

