


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 39 (24-30 กันยายน 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 248,322 ราย อัตราป่วย 375.50 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 5 ราย จังหวัดสงขลา ตาก และพิษณุโลก จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.003 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-14 ปี เท่ากับ 1,453.77 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี (1,389.00) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (368.36) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง เท่ากับ 444.02 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคเหนือ (366.59) ภาคใต้ (360.52) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (311.24) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 1,094.92 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (895.01) กรุงเทพมหานคร (700.27) เชียงใหม่ (671.96) ยโสธร (662.06) พัทลุง (653.28) อุบลราชธานี (628.81) ลำพูน (606.13) นครปฐม (602.47) และจันทบุรี (574.14) ตามลำดับ
ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ระยอง	1,094.92
2	ภูเก็ต	895.01
3	กรุงเทพมหานคร	700.27
4	เชียงใหม่	671.96
5	ยโสธร	662.06
6	พัทลุง	653.28
7	อุบลราชธานี	628.81
8	ลำพูน	606.13
9	นครปฐม	602.47
10	จันทบุรี	574.14

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 7,715 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 958 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.42 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 410 ราย (ร้อยละ 42.80) ชนิด A/H3N2 จำนวน 362 ราย (ร้อยละ 37.79) และชนิด B จำนวน 186 ราย (ร้อยละ 19.42) ในสัปดาห์ที่ 39 (ระหว่างวันที่ 24 กันยายน-30 กันยายน 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 255 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 12 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.63 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 38 ราย (ร้อยละ 52.05) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 28.77) และชนิด B จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 19.18) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 255 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–30 กันยายน 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–30 กันยายน 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 58 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดกระบี่ สงขลา แม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ นราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี เพชรบูรณ์ สุรินทร์ สระบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบูรณ์ นครนายก สระแก้ว อุบลราชธานี พิษณุโลก สตูล ราชบุรี สุโขทัย ลำพูน กาฬสินธุ์ สมุทรสงคราม ภูเก็ต นครราชสีมา มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร และเชียงราย จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 39 (ระหว่างวันที่ 24 กันยายน–30 กันยายน 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 9 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 687 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ด้วยอาการไข้สูง ไอ และเจ็บคอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 12 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 10 ราย (ร้อยละ 83.33)

2) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 616 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดมหาสารคาม เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ และปวดศีรษะ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 21 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H1N1 (2009) 16 ราย (ร้อยละ 76.19)

3) ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ 210 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยภูมิ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 10 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 8 ราย (ร้อยละ 80.00) แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) 6 ราย และชนิด B 2 ราย

4) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 15 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 5 ราย (ร้อยละ 100.00)


5) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 27 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ไอ มีไข้ และเจ็บคอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 27 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 27 ราย (ร้อยละ 100.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 3 ราย ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

6) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 252 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดบึงกาฬ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม

7) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 605 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดชุมพร เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ด้วยอาการไข้ มีน้ำมูก ไอ และเจ็บคอ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม

8) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 113 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ไอ และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 5 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 3 ราย (ร้อยละ 60.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 5 ราย (ร้อยละ 100.00)

9) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 5 ราย ในค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดกล้ามเนื้อ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จำนวน 3 ราย ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565-30 กันยายน 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา