


### รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 40 (1-7 ตุลาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-7 ตุลาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 279,098 ราย อัตราป่วย 421.78 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 13 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 6 ราย จังหวัดสงขลา ตาก พิชณุโลก ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.005 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A โดยรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มียังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566  
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-14 ปี เท่ากับ 1,616.10 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี (1,536.75) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (412.89) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-7 ตุลาคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง เท่ากับ 501.97 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคเหนือ (421.30) ภาคใต้ (376.12) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (354.23) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 1,243.80 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (892.60) เชียงใหม่ (793.63) กรุงเทพมหานคร (789.66) อุบลราชธานี (735.62) ยโสธร (711.70) นครปฐม (680.26) ลำพูน (674.28) หนองคาย (669.39) และฉะเชิงเทรา (666.00) ตามลำดับ  
ดังรูปที่ 3




### จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

| ลำดับ | จังหวัด       | อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน |
|-------|---------------|--------------------------|
| 1     | ระยอง         | 1,243.80                 |
| 2     | ภูเก็ต        | 892.60                   |
| 3     | เชียงใหม่     | 793.63                   |
| 4     | กรุงเทพมหานคร | 789.66                   |
| 5     | อุบลราชธานี   | 735.62                   |
| 6     | ยโสธร         | 711.70                   |
| 7     | นครปฐม        | 680.26                   |
| 8     | ลำพูน         | 674.28                   |
| 9     | หนองคาย       | 669.39                   |
| 10    | ฉะเชิงเทรา    | 666.00                   |

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

### รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-7 ตุลาคม 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-7 ตุลาคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 7,966 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,026 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.88 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 423 ราย (ร้อยละ 41.23) ชนิด A/H3N2 จำนวน 404 ราย (ร้อยละ 39.37) และชนิด B จำนวน 199 ราย (ร้อยละ 19.40) ในสัปดาห์ที่ 40 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-7 ตุลาคม 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 251 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.09 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 42 ราย (ร้อยละ 61.76) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 19.12) และชนิด B จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 19.12) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 251 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



**แหล่งข้อมูล :** ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

**รูปที่ 4** จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–7 ตุลาคม 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–7 ตุลาคม 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 61 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดกระบี่ สงขลา แม่ฮ่องสอน อุดรธานี จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดแพร่ นราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี เพชรบูรณ์ สุรินทร์ สระบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก สระแก้ว อุบลราชธานี พิจิตรโลก สตูล ราชบุรี สุโขทัย ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต นครราชสีมา มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร และเชียงราย จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 40 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม–7 ตุลาคม 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 3 เหตุการณ์ ดังนี้


- 1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 196 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว และอ่อนเพลีย ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ



ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 4 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 2 ราย (ร้อยละ 50.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 5 ราย (ร้อยละ 100.00)

2) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 107 ราย ในไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ และเจ็บคอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 15 ราย ที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านการควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 12 ราย (ร้อยละ 80.00) แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) 6 ราย และชนิด A/H3N2 จำนวน 6 ราย

3) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 33 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มพบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 33 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 18 ราย (ร้อยละ 54.54) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565–7 ตุลาคม 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสกา  
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา