


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 41 (8-14 ตุลาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 ตุลาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 313,181 ราย อัตราป่วย 473.29 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 18 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 6 ราย สงขลา และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 2 ราย ตาก พิชณุโลก ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ราชบุรี เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.006 ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-14 ปี เท่ากับ 1,773.15 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี (1,701.91) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (464.57) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 ตุลาคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง เท่ากับ 571.49 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคเหนือ (469.50) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (403.60) และภาคใต้ (392.19) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 1,422.09 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (992.47) เชียงใหม่ (889.82) กรุงเทพมหานคร (867.39) อุบลราชธานี (813.01) ฉะเชิงเทรา (765.39) ยโสธร (764.88) นครปฐม (758.27) ลำพูน (756.80) และหนองคาย (745.57) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ระยอง	1,422.09
2	ภูเก็ต	992.47
3	เชียงใหม่	889.82
4	กรุงเทพมหานคร	867.39
5	อุบลราชธานี	813.01
6	ฉะเชิงเทรา	765.39
7	ยโสธร	764.88
8	นครปฐม	758.27
9	ลำพูน	756.80
10	หนองคาย	745.57

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-14 ตุลาคม 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 ตุลาคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 8,174 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,087 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.30 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 438 ราย (ร้อยละ 40.30) ชนิด A/H3N2 จำนวน 437 ราย (ร้อยละ 40.20) และชนิด B จำนวน 212 ราย (ร้อยละ 19.50) ในสัปดาห์ที่ 41 (ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม-14 ตุลาคม 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 208 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 12 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.33 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 33 ราย (ร้อยละ 54.10) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 24.59) และชนิด B จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 21.31) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 208 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–14 ตุลาคม 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–14 ตุลาคม 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 64 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา 4 เหตุการณ์ จังหวัดกระบี่ แม่ฮ่องสอน อุตรธานี จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดแพร่ นราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี เพชรบูรณ์ สุรินทร์ สระบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สระแก้ว จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก อุบลราชธานี พิษณุโลก สตูล ราชบุรี สุโขทัย ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต นครราชสีมา มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร เชียงราย และลพบุรี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 41 (ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม–14 ตุลาคม 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 3 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 30 ราย ในค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดสระแก้ว เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ หาวสั้น ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก และปวดศีรษะ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 15 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 10 ราย (ร้อยละ 66.67) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 5 ราย (ร้อยละ 100.00)

2) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 10 ราย ในค่ายฝึกอบรมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งหนึ่ง จังหวัดสงขลา เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการไอ และเหนื่อยง่าย ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 1 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 1 ราย (ร้อยละ 100.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 9 ราย ที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 5 ราย (ร้อยละ 55.56) แยกเป็นชนิด A/H3 4 ราย และชนิด A ไม่ระบุสายพันธุ์ จำนวน 1 ราย

3) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 145 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดลพบุรี เริ่มพบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการไข้สูง และหนาวสั่น ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 44 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 18 ราย (ร้อยละ 40.10) และตรวจ Antigen Test Kit for COVID-19 20 ราย ผลตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 1 ราย (ร้อยละ 50.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 13 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 13 ราย (ร้อยละ 100.00) โดยในจำนวนนี้พบติดเชื้อ SARS-CoV-2 ร่วมด้วย 2 ราย ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565–14 ตุลาคม 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา