


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 42 (15-21 ตุลาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-21 ตุลาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 341,917 ราย อัตราป่วย 516.71 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 20 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 6 ราย จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดตาก พิจิตร โลกชัย ภูมิภาคนครราชสีมา ราชบุรี เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช และปทุมธานี จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.006 ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-14 ปี เท่ากับ 1,879.80 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี (1,855.25) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (512.58) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-21 ตุลาคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง เท่ากับ 622.11 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (501.41) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (458.32) และภาคใต้ (405.87) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 1,549.30 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (1,039.88) กรุงเทพมหานคร (949.42) อุบลราชธานี (892.91) เชียงใหม่ (890.67) ฉะเชิงเทรา (820.64) นครปฐม (817.16) ลำพูน (806.61) ยโสธร (785.97) และหนองคาย (772.11) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ระยอง	1,549.30
2	ภูเก็ต	1,039.88
3	กรุงเทพมหานคร	949.42
4	อุบลราชธานี	892.91
5	เชียงใหม่	890.67
6	ฉะเชิงเทรา	820.64
7	นครปฐม	817.16
8	ลำพูน	806.61
9	ยโสธร	785.97
10	หนองคาย	772.11

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-21 ตุลาคม 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-21 ตุลาคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 8,401 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,148 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.67 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 472 ราย (ร้อยละ 41.11) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 458 ราย (ร้อยละ 39.90) และชนิด B จำนวน 218 ราย (ร้อยละ 18.99) ในสัปดาห์ที่ 42 (ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม-21 ตุลาคม 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 227 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 14 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.87 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 35 ราย (ร้อยละ 57.38) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 32.79) และชนิด B จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 9.83) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 227 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–21 ตุลาคม 2566


จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–21 ตุลาคม 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 68 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ จังหวัดละ 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา 4 เหตุการณ์ จังหวัดกระบี่ แม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดแพร่ นราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี เพชรบูรณ์ สุรินทร์ สระบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สระแก้ว นครราชสีมา จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก อุบลราชธานี พิษณุโลก สตูล ราชบุรี สุโขทัย ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร เชียงราย ลพบุรี บุรีรัมย์ และน่าน จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 42 (ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม–21 ตุลาคม 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 4 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 12 ราย ในวัดแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการไข้สูง และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 5 ราย (ร้อยละ 100.00)

2) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 570 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการไข้สูง และเหนื่อยเพลีย ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 2 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 1 ราย (ร้อยละ 50.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 14 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 14 ราย (ร้อยละ 100.00)

3) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 560 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดน่าน เริ่มพบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ด้วยอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ และเบื่ออาหาร ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 5 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 3 ราย (ร้อยละ 60) แยกเป็นชนิด B 2 ราย และชนิด A 1 ราย และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 8 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 2 ราย (ร้อยละ 25.00)

4) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 178 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา เริ่มพบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ปวดเมื่อยร่างกาย ไอ และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 4 ราย ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555-21 ตุลาคม 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา