


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 44 (29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-4 พฤศจิกายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 372,068 ราย อัตราป่วย 562.28 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 23 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 7 ราย จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี เพชรบูรณ์ และกาฬสินธุ์ จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดตาก พิจิตรโลก ชัยภูมิ ราชบุรี นครศรีธรรมราช และปทุมธานี จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.006 ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 2,011.56 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (1,962.33) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (565.15) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-4 พฤศจิกายน 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง เท่ากับ 692.33 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคเหนือ (554.05) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (483.45) และภาคใต้ (429.20) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 1,744.79 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (1,169.12) กรุงเทพมหานคร (1,052.52) เชียงใหม่ (989.55) อุบลราชธานี (943.27) ลำพูน (914.40) ฉะเชิงเทรา (911.83) นครปฐม (872.03) จันทบุรี (824.59) และหนองคาย (818.28) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ระยอง	1,744.79
2	ภูเก็ต	1,169.12
3	กรุงเทพมหานคร	1,052.52
4	เชียงใหม่	989.55
5	อุบลราชธานี	943.27
6	ลำพูน	914.40
7	ฉะเชิงเทรา	911.83
8	นครปฐม	872.03
9	จันทบุรี	824.59
10	หนองคาย	818.28

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-4 พฤศจิกายน 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-4 พฤศจิกายน 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 8,576 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,181 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.77 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 490 ราย (ร้อยละ 41.49) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 466 ราย (ร้อยละ 39.46) และชนิด B จำนวน 225 ราย (ร้อยละ 19.05) ในสัปดาห์ที่ 44 (ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 199 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.11 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 47.62) ชนิด B จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 45.24) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 7.14) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 199 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–4 พฤศจิกายน 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–4 พฤศจิกายน 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 75 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด สงขลา จังหวัดละ 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี 4 เหตุการณ์ จังหวัดกระบี่ แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดแพร่ นราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี สุรินทร์ สระบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ สมุทรสงคราม สระแก้ว นครราชสีมา สุโขทัย บุรีรัมย์ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก อุบลราชธานี พิษณุโลก สตูล ราชบุรี ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร เชียงราย ลพบุรี น่าน ขอนแก่น และลำปาง จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 44 (ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม–4 พฤศจิกายน 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 4 เหตุการณ์ ดังนี้

- 1) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 17 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดลำปาง ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A 8 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม
- 2) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 149 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 14 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 14 ราย (ร้อยละ 100.00) แยกเป็นชนิด B 12 ราย และชนิด A 2 ราย
- 3) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 55 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 10 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 6 ราย (ร้อยละ 60.00)
- 4) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 34 ราย ในศูนย์สงเคราะห์แห่งหนึ่ง จังหวัดสงขลา เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 10 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 9 ราย (ร้อยละ 90.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565-4 พฤศจิกายน 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา