


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 45 (5-11 พฤศจิกายน 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 พฤศจิกายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 388,737 ราย อัตราป่วย 587.47 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 24 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 7 ราย จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี เพชรบูรณ์ และกาฬสินธุ์ จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดตาก พิจิตรโลก ชัยภูมิ ราชบุรี นครศรีธรรมราช ปทุมธานี และลำพูน จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.006 ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 2,092.34 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (2,032.45) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (596.10) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 พฤศจิกายน 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง เท่ากับ 719.95 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคเหนือ (583.94) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (508.01) และภาคใต้ (443.48) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 1,826.49 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (1,257.92) เชียงใหม่ (1,096.69) กรุงเทพมหานคร (1,096.26) ลำพูน (963.22) อุบลราชธานี (947.86) ฉะเชิงเทรา (939.18) นครปฐม (887.35) จันทบุรี (840.43) และยโสธร (829.45) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ระยอง	1,826.49
2	ภูเก็ต	1,257.92
3	เชียงใหม่	1,096.69
4	กรุงเทพมหานคร	1,096.26
5	ลำพูน	963.22
6	อุบลราชธานี	947.86
7	ฉะเชิงเทรา	939.18
8	นครปฐม	887.35
9	จันทบุรี	840.43
10	ยโสธร	829.45

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-11 พฤศจิกายน 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 พฤศจิกายน 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 9,002 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,268 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.09 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 533 ราย (ร้อยละ 42.03) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 475 ราย (ร้อยละ 37.46) และชนิด B จำนวน 260 ราย (ร้อยละ 20.51) ในสัปดาห์ที่ 45 (ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน-11 พฤศจิกายน 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 227 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 12 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.82 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 23 ราย (ร้อยละ 51.11) ชนิด B จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 35.56) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 13.33) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 227 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–11 พฤศจิกายน 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–11 พฤศจิกายน 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 77 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด สงขลา จังหวัดละ 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี 4 เหตุการณ์ จังหวัดกระบี่ แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดแพร่ นราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี สุรินทร์ สระบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ สมุทรสงคราม สระแก้ว นครราชสีมา สุโขทัย บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก พิษณุโลก สตูล ราชบุรี ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร เชียงราย ลพบุรี น่าน และลำปาง จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 45 (ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน–11 พฤศจิกายน 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 66 ราย ในศูนย์อบรมแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ และเจ็บคอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 18 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H3N2 10 ราย (ร้อยละ 55.56)

2) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 44 ราย ในค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 15 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 15 ราย (ร้อยละ 100.00) แยกเป็นชนิด A 13 ราย และชนิด B 2 ราย และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 3 ราย ที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 3 ราย (ร้อยละ 100.00) ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565–11 พฤศจิกายน 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา