


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 47 (19–25 พฤศจิกายน 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–25 พฤศจิกายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 418,591 ราย อัตราป่วย 632.59 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 7 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ราย จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ และสุรินทร์ จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดตาก พิษณุโลก ชัยภูมิ ราชบุรี นครศรีธรรมราช ปทุมธานี และลำพูน จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.006 ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0–4 ปี เท่ากับ 2,220.09 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5–14 ปี (2,180.77) และกลุ่มอายุ 15–24 ปี (650.51) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 พฤศจิกายน 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง เท่ากับ 774.07 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (657.02) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (530.94) และภาคใต้ (481.60) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 1,958.71 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (1,367.42) กรุงเทพมหานคร (1,188.04) เชียงใหม่ (1,167.46) ลำพูน (1,045.24) พะเยา (1,036.27) ฉะเชิงเทรา (1,011.92) อุบลราชธานี (1,003.99) นครปฐม (955.91) และจันทบุรี (870.43) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ระยอง	1,958.71
2	ภูเก็ต	1,367.42
3	กรุงเทพมหานคร	1,188.04
4	เชียงใหม่	1,167.46
5	ลำพูน	1,045.24
6	พะเยา	1,036.27
7	ฉะเชิงเทรา	1,011.92
8	อุบลราชธานี	1,003.99
9	นครปฐม	955.91
10	จันทบุรี	870.43

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-25 พฤศจิกายน 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 พฤศจิกายน 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 9,522 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,388 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.58 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 577 ราย (ร้อยละ 41.57) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 485 ราย (ร้อยละ 34.94) และชนิด B จำนวน 326 ราย (ร้อยละ 23.49) ในสัปดาห์ที่ 47 (ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน-25 พฤศจิกายน 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 262 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 14 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.90 แยกเป็นชนิด B จำนวน 33 ราย (ร้อยละ 55.00) ชนิด A/H3N2 จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 36.67) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 8.33) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 262 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–25 พฤศจิกายน 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–25 พฤศจิกายน 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 83 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด สงขลา จังหวัดละ 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี กรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน 4 เหตุการณ์ จังหวัดกระบี่ เพชรบูรณ์ แพร่ จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดนราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี สุรินทร์ สระบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ สมุทรสงคราม สระแก้ว นครราชสีมา สุโขทัย บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบูรณ์ นครนายก พิจิตรโลก สตูล ราชบุรี ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร เชียงราย ลพบุรี น่าน ลำปาง เชียงใหม่ เลย และสกลนคร จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 47 (ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน–25 พฤศจิกายน 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ 16 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสกลนคร เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ด้วยอาการไข้สูง หนาวสั่น และปวดกล้ามเนื้อ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 16 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 16 ราย ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565–25 พฤศจิกายน 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา