


### รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 48 (26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-2 ธันวาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 427,610 ราย อัตราป่วย 646.22 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 29 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 8 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ราย จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และตาก จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดพิษณุโลก ชัยภูมิ ราชบุรี นครศรีธรรมราช ปทุมธานี และลำพูน จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.007 ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566  
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 2,262.58 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (2,227.36) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (665.85) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-2 ธันวาคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง เท่ากับ 787.62 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคเหนือ (677.01) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (538.13) และภาคใต้ (501.94) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 2,002.06 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (1,397.74) กรุงเทพมหานคร (1,189.91) เชียงใหม่ (1,168.98) พะเยา (1,157.59) ลำพูน (1,047.47) อุบลราชธานี (1,034.70) ฉะเชิงเทรา (1,023.02) นครปฐม (960.80) และจันทบุรี (881.24) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




### จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

| ลำดับ | จังหวัด       | อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน |
|-------|---------------|--------------------------|
| 1     | ระยอง         | 2,002.06                 |
| 2     | ภูเก็ต        | 1,397.74                 |
| 3     | กรุงเทพมหานคร | 1,189.91                 |
| 4     | เชียงใหม่     | 1,168.98                 |
| 5     | พะเยา         | 1,157.59                 |
| 6     | ลำพูน         | 1,047.47                 |
| 7     | อุบลราชธานี   | 1,034.70                 |
| 8     | ฉะเชิงเทรา    | 1,023.02                 |
| 9     | นครปฐม        | 960.80                   |
| 10    | จันทบุรี      | 881.24                   |

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

### รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-2 ธันวาคม 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-2 ธันวาคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 9,769 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,429 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.63 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 589 ราย (ร้อยละ 41.22) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 486 ราย (ร้อยละ 34.01) และชนิด B จำนวน 354 ราย (ร้อยละ 24.77) ในสัปดาห์ที่ 48 (ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 247 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 14 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.60 แยกเป็นชนิด B จำนวน 28 ราย (ร้อยละ 68.29) ชนิด A/H3N2 จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 29.27) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 2.44) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 247 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




**แหล่งข้อมูล :** ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

**รูปที่ 4** จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–2 ธันวาคม 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–2 ธันวาคม 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 83 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด สงขลา จังหวัดละ 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี กรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน 4 เหตุการณ์ จังหวัดกระบี่ เพชรบูรณ์ แพร่ จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดนราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี สุรินทร์ สระบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ สมุทรสงคราม สระแก้ว นครราชสีมา สุโขทัย บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบูรณ์ นครนายก พิชณุโลก สตูล ราชบุรี ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร เชียงราย ลพบุรี น่าน ลำปาง เชียงใหม่ เลย และสกลนคร จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 48 (ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน–2 ธันวาคม 2566) ไม่มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังรูปที่ 5





แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565-2 ธันวาคม 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา