


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 50 (10-16 ธันวาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-16 ธันวาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 460,325 ราย อัตราป่วย 695.66 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 29 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 8 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ราย จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และตาก จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดพิษณุโลก ชัยภูมิ ราชบุรี นครศรีธรรมราช ปทุมธานี และลำพูน จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.006 ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 2,414.02 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 5-14 ปี (2,401.64) และอายุ 15-24 ปี (716.10) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-16 ธันวาคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 835.50 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (743.53) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (579.46) และภาคใต้ (551.10) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 2,036.74 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พะเยา (1,480.03) ภูเก็ต (1,438.90) กรุงเทพมหานคร (1,295.73) เชียงใหม่ (1,280.83) ลำพูน (1,157.25) อุบลราชธานี (1,067.28) ฉะเชิงเทรา (1,062.03) นครปฐม (989.92) และเชียงราย (920.13) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ระยอง	2,036.74
2	พะเยา	1,480.03
3	ภูเก็ต	1,438.90
4	กรุงเทพมหานคร	1,295.73
5	เชียงใหม่	1,280.83
6	ลำพูน	1,157.25
7	อุบลราชธานี	1,067.28
8	ฉะเชิงเทรา	1,062.03
9	นครปฐม	989.92
10	จันทบุรี	920.13

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-16 ธันวาคม 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-16 ธันวาคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 10,209 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,509 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.78 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 619 ราย (ร้อยละ 41.02) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 490 ราย (ร้อยละ 32.47) และชนิด B จำนวน 400 ราย (ร้อยละ 26.51) ในสัปดาห์ที่ 50 (ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม-16 ธันวาคม 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 209 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 14 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.14 แยกเป็นชนิด B จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 52.50) ชนิด A/H3N2 จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 37.50) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 10.00) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 209 รายไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–16 ธันวาคม 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–16 ธันวาคม 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 86 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด สงขลา จังหวัดละ 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี กรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน 4 เหตุการณ์ จังหวัดกระบี่ เพชรบูรณ์ แพร่ จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดนราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี สุรินทร์ สระบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ สมุทรสงคราม สระแก้ว นครราชสีมา สุโขทัย บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี ลำปาง เชียงใหม่ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก พิษณุโลก สตูล ราชบุรี ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร เชียงราย ลพบุรี น่าน เลย สกลนคร และกาญจนบุรี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 50 (ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม–16 ธันวาคม 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 28 ราย ในค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดเมื่อยตามร่างกาย ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 7 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 3 ราย (ร้อยละ 42.86)

2) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 85 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ด้วยอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และหอบเหนื่อย ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 10 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 5 ราย (ร้อยละ 50.00) ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565–16 ธันวาคม 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา