


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 52 (24–30 ธันวาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–30 ธันวาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 472,222 ราย อัตราป่วย 713.63 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 29 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 8 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ราย จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และตาก จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดพิษณุโลก ชัยภูมิ ราชบุรี นครศรีธรรมราช ปทุมธานี และลำพูน จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.006 ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0–4 ปี เท่ากับ 2,461.74 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 5–14 ปี (2,455.93) และอายุ 15–24 ปี (732.00) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 ธันวาคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 863.45 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (753.81) ภาคใต้ (596.91) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (579.05) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 2,051.38 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พะเยา (1,587.51) ภูเก็ต (1,579.92) กรุงเทพมหานคร (1,344.60) เชียงใหม่ (1,344.14) ลำพูน (1,251.91) อุบลราชธานี (1,080.26) ฉะเชิงเทรา (1,076.32) นครปฐม (1,003.50) และพัทลุง (1,001.77) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ระยอง	2,051.38
2	พะเยา	1,587.51
3	ภูเก็ต	1,579.92
4	กรุงเทพมหานคร	1,344.60
5	เชียงใหม่	1,344.14
6	ลำพูน	1,251.91
7	อุบลราชธานี	1,080.26
8	ฉะเชิงเทรา	1,076.32
9	นครปฐม	1,003.50
10	พัทลุง	1,001.77

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-30 ธันวาคม 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 ธันวาคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 10,618 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,580 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.88 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 646 ราย (ร้อยละ 40.89) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 496 ราย (ร้อยละ 31.39) และชนิด B จำนวน 438 ราย (ร้อยละ 27.72) ในสัปดาห์ที่ 52 (ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม-30 ธันวาคม 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 174 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.24 แยกเป็นชนิด B จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.34) ชนิด A/H3N2 จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 33.33) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 13.33) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 174 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–30 ธันวาคม 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–30 ธันวาคม 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 89 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด สงขลา จังหวัดละ 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี กรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน 4 เหตุการณ์ จังหวัดกระบี่ เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุรินทร์ นครสวรรค์ จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดนราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี สระบุรี ชัยภูมิ สมุทรสงคราม สระแก้ว นครราชสีมา สุโขทัย บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก พิษณุโลก สตูล ราชบุรี ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร เชียงราย ลพบุรี น่าน เลย สกลนคร และกาญจนบุรี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 52 (ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม–30 ธันวาคม 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 69 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดสุรินทร์ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ด้วยอาการไข้ และปวดศีรษะ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 22 ราย (ร้อยละ 31.88)

2) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 85 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกใส และปวดศีรษะ จากการคัดกรองผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จำนวน 246 ราย ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 85 ราย (ร้อยละ 34.55) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 10 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565–30 ธันวาคม 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา