


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 53 (31 ธันวาคม 2566–6 มกราคม 2567)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566–6 มกราคม 2567 มีรายงานผู้ป่วย 483,965 ราย อัตราป่วย 731.38 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 29 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 8 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ราย จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และตาก จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดพิษณุโลก ชัยภูมิ ราชบุรี นครศรีธรรมราช ปทุมธานี และลำพูน จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.006 ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5–14 ปี เท่ากับ 2,518.66 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0–4 ปี (2,518.24) และอายุ 15–24 ปี (749.88) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566–6 มกราคม 2567

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 876.15 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (793.49) ภาคใต้ (622.48) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (586.47) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 2,062.62 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พะเยา (1,709.25) ภูเก็ต (1,637.44) กรุงเทพมหานคร (1,370.32) เชียงใหม่ (1,354.46) ลำพูน (1,243.98) ฉะเชิงเทรา (1,088.82) อุบลราชธานี (1,086.19) พัทลุง (1,062.65) และนครปฐม (1,004.04) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ระยอง	2,062.62
2	พะเยา	1,709.25
3	ภูเก็ต	1,637.44
4	กรุงเทพมหานคร	1,370.32
5	เชียงใหม่	1,354.46
6	ลำพูน	1,243.98
7	ฉะเชิงเทรา	1,088.82
8	อุบลราชธานี	1,086.19
9	พัทลุง	1,062.65
10	นครปฐม	1,004.04

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม 2566-6 มกราคม 2567

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566-6 มกราคม 2567 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 10,844 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.91 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 662 ราย (ร้อยละ 40.94) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 502 ราย (ร้อยละ 31.05) และชนิด B จำนวน 453 ราย (ร้อยละ 28.01) ในสัปดาห์ที่ 53 (ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566-6 มกราคม 2567) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 226 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.37 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 43.24) ชนิด B จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 40.54) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 16.22) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 226 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–6 มกราคม 2567

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566–6 มกราคม 2567 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 90 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด สงขลา จังหวัดละ 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี กรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน 4 เหตุการณ์ จังหวัดกระบี่ เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุรินทร์ นครสวรรค์ จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดนราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี สระบุรี ชัยภูมิ สมุทรสงคราม สระแก้ว นครราชสีมา สุโขทัย บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก พิษณุโลก สตูล ราชบุรี ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร เชียงราย ลพบุรี น่าน เลย สกลนคร กาญจนบุรี และอุทัยธานี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 53 (ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566–6 มกราคม 2567) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 291 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดอุทัยธานี เริ่มพบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 5 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A ทั้ง 5 ราย (ร้อยละ 100.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 13 ราย ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565–6 มกราคม 2567

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา