

ผลการจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่โดยคณะกรรมการฯ

กลุ่ม	ชนิดวัคซีน (กลุ่มเป้าหมาย)	กำหนดการให้วัคซีน
1 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่นำเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยทันที	HPV (ผู้ติดเชื้อ HIV หญิง)	3 เข็ม ระยะห่าง 0, 1-2, 6 เดือน
	HB (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข)	3 เข็ม ระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน
	MR (ผู้เกิดปี 2520-2545)	1 เข็ม
	HB (HIV/ภูมิคุ้มกันบกพร่อง/ไตวาย)	3 เข็ม ระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน
	HPV (ผู้หญิง อายุ 15-26 ปี)	3 เข็ม ระยะห่าง 0, 1-2, 6 เดือน
2 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเร็ว	Rabies แบบ ID (ผู้มีโอกาสสัมผัสเชื้อ)	2 เข็ม ในวันที่ 0 และ 7
	PPSV23 (ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป)	1 เข็ม
3 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทันทีเมื่อมีความพร้อม	Influenza (บุคคลรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก)	1 เข็ม ทุกปี
	Varicella ตรวจสอบประวัติ (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข)	2 เข็ม ระยะห่าง 1 เดือน